



ASTRAZENECA ESPECIALIDADES

Nolvadex-D Tamoxifeno 20 mg 30 Comprimidos Recubiertos



TAMOXIFENO

¿Para qué enfermedades o condiciones se prescribe este medicamento?



Tamoxifeno se encuentra indicado en el tratamiento del cáncer de mama.

También se puede utilizar en otras condiciones indicadas por su médico donde se requiera regular la formación de estrógeno.

¿Qué efectos produce en el organismo?

Tamoxifeno produce una disminución en los niveles de estrógeno. Algunos cánceres de mama requieren de la hormona estrógeno para su crecimiento y se conocen como cánceres de mama con receptor de estrógeno positivo. Tamoxifeno inhibe la actividad que regula la formación de estrógeno provocando una baja en sus niveles. Esta disminución de estrógeno permite disminuir el crecimiento de células cancerígenas.

¿Este medicamento requiere indicación médica?

Sí, el uso de tamoxifeno requiere indicación y supervisión médica. El tiempo de tratamiento debe ser indicado por el especialista de manera personalizada, dependiendo de la condición particular de cada paciente. Es necesario realizar un seguimiento para establecer la eficacia del tratamiento y la posible aparición de efectos adversos.

¿Qué precauciones debo tener al usar este medicamento?

Tamoxifeno puede causar efectos adversos en distintos grados y etapas del tratamiento. Dentro de los efectos adversos más comunes se encuentran: irregularidades en el periodo menstrual, bochornos, sequedad vaginal, hinchazón en las extremidades, náuseas, entre otros. El uso de lubricantes o geles vaginales puede reducir las molestias asociadas a sequedad vaginal como picazón, irritación, ardor y dolor. Los bochornos son un efecto común debido a la privación de estrógenos. En general, estos pueden ir disminuyendo con el tiempo, reducir el consumo de bebidas calientes con cafeína, como el té y el café, puede ayudar a disminuir la aparición de bochornos.

Lea el folleto de información al paciente e informe a su médico si presenta alguno de los efectos secundarios descritos para el medicamento, pero sin suspender el tratamiento por su cuenta. El médico evaluará la causa del problema y le indicará la mejor manera de continuar su tratamiento.

Si sospecha que ha quedado embarazada durante el uso de tamoxifeno, informe a su médico de inmediato.

En caso de olvidar tomar un comprimido, tome uno tan pronto como lo recuerde. En caso de que sea casi la hora de su siguiente dosis, omita la dosis olvidada y continúe con su tratamiento. No duplique la dosis.

Presentación

Tamoxifeno se presenta en forma de comprimidos.

Modo de almacenamiento

Este medicamento se debe almacenar a temperatura ambiente (no más de 25°C) y protegido de la luz. No requiere refrigeración.