

MERCK

Eutirox 25 Levotiroxina 25 mcg 50 Comprimidos



Eutirox 25 Levotiroxina 25 mcg 50 Comprimidos

Este medicamento se utiliza para tratar el hipotiroidismo, una afección en la cual la tiroides no produce suficiente cantidad de hormona tiroidea. El medicamento actúa reemplazando la hormona tiroidea que normalmente produce nuestro organismo.

Beneficios

Terapia de reemplazo o sustitución de la función tiroidea ausente o deprimida. Supresión de la secreción de tirotrófina. Usos: Bocio simple (bocio eutiroides). Prevención de nuevo desarrollo de bocio tras operación de bocio (profilaxis de recidiva de bocio). Medicación adicional en el tratamiento de la hiperfunción tiroidea (hipertiroidismo), luego de alcanzar el estado funcional normal. Hipofunción tiroidea (hipotiroidismo). Terapia de sustitución en tiroidectomía total por tumor en la tiroides.

Principales principios activos

- Eutirox® 25 mcg: Cada comprimido contiene: Levotiroxina Sódica 25 mcg. Eutirox® 50 mcg: Cada comprimido contiene: Levotiroxina Sódica 50 mcg. Eutirox® 75 mcg: Cada comprimido contiene: Levotiroxina Sódica 75 mcg. Eutirox® 88 mcg: Cada comprimido contiene: Levotiroxina Sódica 88 mcg. Eutirox® 100 mcg: Cada comprimido contiene: Levotiroxina Sódica 100 mcg. Eutirox® 112 mcg: Cada comprimido contiene: Levotiroxina Sódica 112 mcg. Eutirox® 125 mcg: Cada comprimido contiene: Levotiroxina Sódica 125 mcg. Eutirox® 137 mcg: Cada comprimido contiene: Levotiroxina Sódica 137 mcg. Eutirox® 150 mcg: Cada comprimido contiene: Levotiroxina Sódica 150 mcg. Eutirox® 175 mcg: Cada comprimido contiene: Levotiroxina Sódica 175 mcg. Eutirox® 200 mcg: Cada comprimido contiene: Levotiroxina Sódica 200 mcg. Excipientes: Lactosa Monohidrato, Almidón de Maíz, Gelatina, Croscarmelosa Sódica, Estearato de Magnesio.

Modo de uso

A menos que se prescriba algo diferente, rigen las siguientes pautas de dosificación: Indicación: Dosis recomendada (μg de levotiroxina sódica/día). Tratamiento de bocio eutiroides: 25-200. Profilaxis de recidiva luego de cirugía por bocio eutiroides: 75-200. Terapia de sustitución en caso de hipotiroidismo en adultos: Dosis inicial: 25-50. Dosis de mantención: 100-250. Suplementación concomitante durante tratamiento con droga antitiroidea del hipertiroidismo: 50-100. Después de extirpación quirúrgica total de las tiroides: 150-300. Modo y duración del tratamiento: La dosis diaria total se ingiere sin masticar y con algo de líquido, por las mañanas en ayunas, al menos media hora antes del desayuno. Duración del tratamiento: Generalmente durante toda la vida en los casos de hipofunción tiroidea (hipotiroidismo) y luego de extracción quirúrgica parcial o total de la tiroides; desde algunos meses hasta de por vida para el tratamiento del bocio (bocio eutiroides) y para la profilaxis contra la nueva formación de bocio. Además, durante la terapia concomitante en el tratamiento de la hiperfunción tiroidea luego de alcanzar el estado de función normal. Si olvida tomar Eutirox®: No tome doble dosis para compensar el comprimido olvidado, sino que tome la dosis normal al día siguiente.

¿Qué efectos secundarios produce tomar Eutirox?

Usted puede experimentar uno o más de los siguientes efectos adversos si toma más Eutirox del indicado o si no tolera la dosis prescrita (por ejemplo, cuando se aumenta la dosis rápidamente): latidos del corazón irregulares o rápidos, dolor en el pecho, dolor de cabeza, debilidad muscular o calambres, rubor

¿Cuándo se empiezan a notar los efectos del Eutirox?

La Levotiroxina posee una vida media en la circulación de 7 días y tarda 1 semana o más en producir bienestar, pero el saltar la toma de 1 comprimido no se refleja en forma directa. La debilidad o la rigidez muscular o los defectos cognitivos tardan en desaparecer por completo hasta 6 meses.