

Porque cada mujer es única

Libera 0.5 gramos de gel transdérmico,
equivalente a 50 mcg de Estradiol



Pioneros en tecnología
de dosificación

La dosis segura que
controla los síntomas
de la menopausia



Referencias: 1. La Sociedad Norteamericana de menopausia. The 2012 hormone therapy position statement of: The North American Menopause Society. Menopause 2012; 19 (3): 257-71. 2. Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos. ACOG Committee Opinion: Postmenopausal estrogen therapy: Route of administration and risk of venous thromboembolism. Acceso el 24 de enero de 2014.
http://www.acog.org/Resources_And_Publications/Committee_on_Gynecologic_Practice/Postmenopausal_Estrogen_Therapy. 3. Manson JE. KEEPS Study Highlights. http://www.acog.org/Resources_And_Publications/Committee_on_Gynecologic_Practice/Postmenopausal_Estrogen_Therapy. DOI: 10.1089. 5. Wiklund I, y cols. A new methodological approach to the evaluation of quality of life in postmenopausal women. Maturitas 1992; 14 (3): 211-24. 6. Foldart JM, y cols. Impact of percutaneous oestradiol gels in postmenopausal hormone replacement therapy on clinical symptoms and endometrium. Br J Obstet Gynaecol 1997; 104 (3): 305-10. 7. Goddard F. Effects of postmenopausal hormone replacement therapy on lipid, lipoprotein, and apolipoprotein (a) concentrations: analysis of studies published from 1974-2000. Fertil Steril 2001; 75 (3): 696-915. 8. Simon JA. What's new in hormone replacement therapy: focus on transdermal estradiol and micronized progesterone. Climacteric 2012; 15 (Suppl 1): 3-10. 9. Berg JS, y cols. Medication compliance: a healthcare problem. Ann Pharmacother 1995; 27 (17 Suppl): S1-24. 10. De Lunardo MC, y cols. Acceptability assessment of 2 transdermal estradiol gels, 1.5 mg daily (Gynex) and 0.5 mg daily (Estreva) for the treatment of menopause symptoms. Transdermal drug delivery: principles and therapy. Contin Educ Anesth Crit Care Pain 2007; 7 (6): 171-6.



Porque cada mujer es única

La dosis segura que
controla los síntomas
de la menopausia



♦ Menopausia

Estreva®Gel: Eficacia en la punta de sus dedos

Estreva®Gel está indicado en los síntomas vasomotores y urogenitales de la menopausia.

¿Sabía que...?

La Sociedad Norteamericana de la menopausia (NAMS*) concluye que:
*"La individualización es de gran importancia en la terapia hormonal y se deben considerar las prioridades de cada paciente en cuanto a calidad de vida además de sus factores de riesgo..."*¹

¹Por sus siglas en inglés



Porque cada mujer es única

Estreva®Gel: Posología y administración

Dosis precisa en cada aplicación

- ♦ Cada pulsación de la bomba de Estreva®Gel administra exactamente 0,5 mg de E2.
- ♦ La flexibilidad de esta presentación puede beneficiar especialmente a las mujeres con niveles fluctuantes de estrógenos.
- ♦ La dosis recomendada es de 1,5 mg (3 pulsaciones de la bomba dosificadora) durante 24-28 días.



Al combinar conveniencia con eficacia, Estreva®Gel ofrece:

- ♦ **Alivio de una amplia variedad de síntomas menopáusicos:** Sofocos, sudores nocturnos, insomnio, irritabilidad, cambios de humor, cansancio, dolor de cabeza, frecuencia miccional y disuria⁴.
- ♦ **Aplicación transdérmica con un perfil de seguridad favorable.** Como un tratamiento hormonal transdérmico, Estreva®Gel ofrece un tratamiento eficaz sin los efectos adversos sistémicos asociados con el estrógeno vía oral^{2,3}.
- ♦ **Una opción natural.** Estreva®Gel se compone de 17-beta estradiol, un estrógeno fisiológico natural.
- ♦ **Bomba de diseño avanzado.** La bomba al vacío de Estreva®Gel asegura la administración uniforme y precisa de gel. La sensación estética del gel complementará la rutina diaria femenina.
- ♦ **Cumplimiento terapéutico.** Los estudios han demostrado que la facilidad de administración es clave para mejorar la adherencia al tratamiento¹¹.



WOMEN'S HEALTH



♦ Menopausia

Estreva®Gel: Seguridad

- ♦ El estradiol transdérmico no está asociado con un mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares, específicamente ictus y tromboembolismo venoso (TEV)²⁸.
- ♦ De hecho, la evidencia ha demostrado que el uso de estradiol transdérmico mitiga los riesgos de TEV, ictus, colecistitis y cáncer de mama, riesgos que se observan con el TE oral⁸.

La satisfacción de las pacientes puede resultar en una mayor adherencia⁹

Diseño avanzado. Precisión en la dosis. Diseñado para una fácil aplicación, Estreva®Gel tiene en una bomba dosificadora al vacío que garantiza la administración uniforme de la dosis exacta siempre⁸.

Sensación estética. Cómodo de aplicar. Estreva®Gel se ha formulado para asegurar una agradable experiencia de aplicación: Es fácil de aplicar sin ninguna sensación pegajosa y se seca rápidamente. Estas características pueden contribuir a la comodidad de la paciente y a un porcentaje más alto de cumplimiento terapéutico y satisfacción general con el producto.



¿Sabía que...?

Las pacientes prefieren Estreva® Gel:
En un estudio, hasta el 72,9 % de las pacientes prefirieron Estreva® Gel frente a un gel comparable de estradiol¹⁰.

Las mujeres prefirieron Estreva®Gel¹⁰ por su:

- ♦ Tiempo de secado más rápido
- ♦ Facilidad de penetración
- ♦ Aplicación práctica
- ♦ Cantidad de gel a aplicar



Estreva® GEL
ESTRADIOL HEMIHYDRATE 0,1%

Porque cada mujer es única

Estreva®Gel: Control eficaz de los síntomas sistémicos con los beneficios de los tratamientos transdérmicos


- ♦ Nueva evidencia demuestra que la administración transdérmica de estrógenos puede tener importantes beneficios de seguridad en comparación a la administración oral².



Una nueva evidencia del estudio clínica KEEPS muestra que los estrógenos transdérmicos tienen un efecto neutro sobre los lípidos cuando se comparan con los estrógenos por vía oral³.

"Al evitar el metabolismo hepático de primer paso, la administración transdérmica puede mantener su eficacia, incluso a dosis más bajas...".

– J Goodman, Women's Health, 2011.



◆ Menopausia

Estreva®Gel:

Alivio eficaz de los síntomas menopáusicos

Las mujeres que usaron EstrevaGel reportaron una mejoría significativa en los niveles de calidad de vida⁵.

Vida sexual: La menopausia afecta la vida sexual del 40% de mujeres sin tratamiento.

1 de cada 10 mujeres

se ve afectada después del tratamiento.



Labores diarias: Los síntomas de éste período afectan en sus labores diarias al 35% de las mujeres sin tratamiento.

1 de cada 10 mujeres

se ve afectada después del tratamiento.



Las pacientes que están usando EstrevaGel reportaron una mejora del 65% en los síntomas menopáusicos, entre ellos: Sofocación, sudor nocturno, insomnio, irritabilidad, cambios de humor, cansancio, dolor de cabeza, frecuencia miccional y disuria (p=0,036)^{6*}.

* Una reducción promedio del 65 % en el número de pacientes que presentaron síntomas seleccionados. Ninguna diferencia significativa con gel de referencia.

Estreva® GEL

ESTRADIOL HEMIHYDRATE 0.1%

Porque cada mujer es única

En el corazón de Estreva®Gel: 17-beta estradiol

Un estrógeno natural...


Estreva®Gel se compone de un estrógeno natural, 17-beta estradiol, un estrógeno similar al que secretan naturalmente los ovarios.

...vía cutánea. Con una aplicación transdérmica, Estreva®Gel evita el efecto de primer paso del hígado¹⁴.

Disminución del nivel de triglicéridos observada con Estreva®Gel?		Tratamientos orales	
Disminución del nivel de triglicéridos	Colesterol	Estreva®Gel	---
	HDL	Estreva®Gel	+
	LDL	Estreva®Gel	---
	Triglicéridos	Estreva®Gel	++

Adaptado de Gotland IF y cols. 2007¹.

Inicio de acción rápido y sostenido



Comparado con el tratamiento previo, las pacientes en tratamiento con Estreva®Gel presentaron disminuciones significativas en la intensidad de los sofocos, desde las 12 semanas, manteniéndolo durante los seis meses de tratamiento (p<0,001)⁶.