1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

ESTUCHE COMERCIAL:

ESTREVA

Estradiol

GEL TOPICO 0,1%

Estradiol 0.1%

Frasco dosificador de X g

Modo y vía de administración: Vía Tópica

No aplicar en cara y cuello.

Composición para 100g de gel:

Estradiol (como Hemihidrato)

0,1g

Excipientes c.s.

Ethanol anhidro, Agua purificada, Propilenglicol, Dietilenglicol monoetiléter, Carbómero, Trietanolamina, Edetato Disódico.

XX dosis

El sistema dosificador libera dosis unitarias de 0,5 g de gel, correspondientes a 0,5 mg de Estradiol.

Indicaciones terapéuticas, contraindicaciones, precauciones particulares de empleo, efectos indeseables, posología:

Ver inserto.

ADVERTENCIA: NO DEJAR AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Almacenar a no más de 30° C.

GEL TOPICO

0,5 mg/pulsación

D.T. Q.F. Nancy Araneda C.

Reg.I.S.P. N° XXXXX - Chile

Lote:

Fabricación (mes-año):

Vence:

Mayor información en: www.ispch.cl

Venta bajo receta médica en establecimientos tipo A.

©= Marca Registrada.

Elaborado por BESINS Manufacturing Belgium SA.-, Groot Bijhaardenstraat 128,

Drogenbos, Bélgica.

Importado por: Laboratorio Chile S.A., Av. Maratón N°1315. Santiago, Chile.

Distribuido por: Droguería Laboratorio Chile S.A.,

Av. Boulevard Poniente N° 1313. Edif.11 Mod.15, Santiago-Chile

ESTUCHE MUESTRA MEDICA:

ESTREVA

Estradiol GEL TOPICO 0,1% Estradiol 0,1%

Frasco dosificador de X q

MUESTRA MEDICA-PROHIBIDA SU VENTA

Modo y vía de administración: Vía Tópica

No aplicar en cara y cuello.

Composición para 100g de gel:

Estradiol (como Hemihidrato) 0,1g

Excipientes c.s.

Ethanol anhidro, Agua purificada, Propilenglicol, Dietilenglicol monoetiléter, Carbómero, Trietanolamina, Edetato Disódico.

XX dosis

El sistema dosificador libera dosis unitarias de 0,5 g de gel, correspondientes a 0,5 mg de Estradiol.

Indicaciones terapéuticas, contraindicaciones, precauciones particulares de empleo, efectos indeseables, posología:

Ver inserto.

ADVERTENCIA: NO DEJAR AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Almacenar a no más de 30° C.

GEL TOPICO

0,5 mg/pulsación

D.T. Q.F. Nancy Araneda C.

Reg.I.S.P. N° XXXXX - Chile

Lote:

Fabricación (mes-año):

Vence:

Mayor información en: www.ispch.cl

Venta bajo receta médica en establecimientos tipo A.

e Marca Registrada.

Elaborado por BESINS Manufacturing Belgium SA. Groot Bijhaardenstraat 128,

Drogenbos, Bélgica.

Importado por: Laboratorio Chile S.A., Av. Maratón N°1315. Santiago, Chile.

Distribuido por: Droguería Laboratorio Chile S.A.,

Av. Boulevard Poniente N° 1313. Edif.11 Mod.15, Santiago-Chile

ETIQUETA FRASCO COMERCIAL

ESTREVA

Estradiol
GEL TOPICO 0,1%
Estradiol 0,1%

Frasco dosificador de X g GEL TÓPICO 0.5 mg / pulsación

Gel vía tópica

Cada 100 g de gel contienen:

Estradiol (como Hemihidrato) 0,1g

EXCIPIENTES c.s.

El sistema dosificador libera dosis unitarias de 0,5 g de gel, correspondientes a 0,5 mg de Estradiol.

100 DOSIS

MANTENGAS E FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

RESPETAR LA DOSIS RECETADA. NO INGERIR.

Reg. I.S.P. W XXXXXX - Chile

Lote:

Fabricación (mes-año):

Vence:

Venta bajo receta médica en Establecimientos tipo A.

Elaborado por BESINS Manufacturing Belgium SA., Drogenbos, Bélgica Para Laboratorio Chile S.A. Santiago – Chile.

ETIQUETA FRASCO MUESTRA MEDICA:

ESTREVA

Estradiol
GEL TOPICO 0,1%
Estradiol 0,1%
MUESTRA MEDICA-PROHIBIDA SU VENTA

Frasco dosificador de X g
GEL TÓPICO 0.5 mg / pulsación
Gel vía tópica
Cada 100 g de gel contienen:

Estradiol (como Hemihidrato) 0,1g

EXCIPIENTES c.s.

El sistema dosificador libera dosis unitarias de 0,5 g de gel, correspondientes a 0,5 mg de Estradiol. 100 DOSIS

MANTENGAS E FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. RESPETAR LA DOSIS RECETADA. NO INGERIR. **Reg. I.S.P. W XXXXXX - Chile**

Lote:

Fabricación (mes-año):

Vence:

Venta bajo receta médica en Establecimientos tipo A.

Elaborado por BESINS Manufacturing Belgium SA., Drogenbos, Bélgica Para Laboratorio Chile S.A. Santiago – Chile.

ETIQUETA CLINICA

ESTREVA

Estradiol
GEL TOPICO 0,1%
Estradiol 0,1%

XX ESTUCHES X 1 Frasco dosificador de X g

Composición para 100g de gel:

Estradiol (como Hemihidrato) 0,1g

Excipientes c.s.

Ethanol anhidro, Agua purificada, Propilenglicol, Dietilenglicol monoetiléter, Carbómero, Trietanolamina, Edetato Disódico.

D.T. Q.F. Nancy Araneda C.

Reg.I.S.P. N° XXXXX - Chile

Lote:

Fabricación (mes-año):

Vence:

Mayor información en: www.ispch.cl Almacenar a no más de 30° C. VIA TOPICA

ENVASE CLINICO SOLO PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICO - ASISTENCIALES

Elaborado por BESINS Manufacturing Belgium SA., Drogenbos, Bélgica. Importado por Laboratorio Chile S.A., Av. Maratón N°1315. Santiago, Chile. Distribuido por Droguería Laboratorio Chile S.A., Av. Boulevard Poniente N° 1313. Edif.11 Mod.15, Santiago-Chile

ESTUCHE CLÍNICO:

ESTREVA

Estradiol

GEL TOPICO 0.1%

Frasco dosificador de X g

Modo y vía de administración: Vía Tópica

No aplicar en cara y cuello.

Composición para 100g de gel:

Estradiol (como Hemihidrato) 0,1g

Excipientes c.s.

Ethanol anhidro, Agua purificada, Propilenglicol, Dietilenglicol monoetiléter,

Carbómero, Trietanolamina, Edetato Disódico.

XX dosis

El sistema dosificador libera dosis unitarias de 0,5 g de gel, correspondientes a

0,5 mg de Estradiol.

<u>Indicaciones terapéuticas, contraindicaciones, precauciones particulares de</u> empleo, efectos indeseables, posología:

Ver inserto.

ADVERTENCIA: NO DEJAR AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Almacenar a no más de 30° C.

GEL TOPICO

0,5 mg/pulsación

D.T. Q.F. Nancy Araneda C.

Rea.I.S.P. N° XXXXX - Chile

Lote:

Fabricación (mes-año):

Vence:

Mayor información en: www.ispch.cl

Venta bajo receta médica en establecimientos tipo A.

ENVASE CLINICO SOLO PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICO - ASISTENCIALES

Elaborado por BESINS Manufacturing Belgium SA.-, Groot Bijhaardenstraat 128, Drogenbos, Bélgica.

Importado por: Laboratorio Chile S.A., Av. Maratón N°1315. Santiago, Chile.

Distribuido por: Droguería Laboratorio Chile S.A.,

Av. Boulevard Poniente N° 1313. Edif.11 Mod.15, Santiago-Chile