

Folleto de Información al Paciente
THYROZOL 5 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 5 mg

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

1.- COMPOSICION Y PRESENTACION:

Cada comprimido recubierto contiene:

Tiamazol	5 mg
Excipientes	c.s.

Vía de Administración oral

Presentación = Envase con X comprimidos recubiertos

2.- CLASIFICACION: Antitiroideo.

3.- INDICACIONES:

- Tratamiento previo a la cirugía (tiroidectomía subtotal) o radioterapia
- Tratamiento a largo plazo del hipertiroidismo cuando la tiroidectomía está contraindicada o no es viable.
- Tratamiento profiláctico en pacientes con antecedentes de hiperfunción tiroidea y adenomas autónomos, en los que la exposición al yodo (por ejemplo exámenes con medios de contraste que contienen yodo) resulta indispensable.

Este medicamento debe ser usado sólo por indicación de su médico.



4.-ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Antes de usar este medicamento debe sopesarse los riesgos y los beneficios en su uso, los que deben ser discutidos entre Ud. y su médico. Principalmente debe considerar los aspectos siguientes:

- a) **Alergias:** Ud. debe comunicar a su médico si alguna vez ha presentado una reacción alérgica a este medicamento o alguna otra sustancia, ya sea alimentos, preservantes, colorantes, saborizantes u otros medicamentos.
- b) **Embarazo:** Su uso debe ser bajo estricto control médico.
- c) **Lactancia:** Su uso debe ser bajo estricto control médico.
- d) **Niños:** Su uso debe ser bajo estricto control médico.
- e) **Otros:** Thyrozol no debe utilizarse en pacientes que presentan cambios en el recuento sanguíneo (granulocitopenia), colestasis existente antes del inicio de la terapia o daño previo a la médula ósea, luego en un tratamiento con carbamazol o tiamazol.

Thyrozol sólo debe utilizarse en el corto plazo y acompañado de un cuidadoso monitoreo médico en el caso de crecimiento considerable de la glándula tiroidea con constricción de la tráquea, debido al riesgo de un mayor crecimiento tiroideo.

En pacientes con daño hepático, la dosis debe mantenerse lo más baja posible.



5.- INTERACCIONES:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (interacciones). Ud. debe comunicar a su médico de todos los medicamentos que está tomando ya sea con o sin receta médica antes de usar este fármaco.

Alguna de las interacciones descritas son con el uso de: Amiodarona, yoduro de potasio, anticoagulantes, glicósidos digitálicos.

6.- PRESENCIA DE OTRAS ENFERMEDADES:

El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos.

Ud. debe comunicar a su médico si padece de alguna enfermedad, principalmente en los casos siguientes:

- Enfermedades hepáticas (al hígado).
- Daño previo a la médula ósea.

FOLLETO DE INFORMACION
AL PACIENTE

7.- EFECTOS ADVERSOS: (no deseados)

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Algunos de estos efectos pueden requerir atención médica.

Consulte inmediatamente al médico si presenta algunos de los síntomas siguientes:

Inflamación de la mucosa oral y faringea, fiebre alta y prolongada, formación de furúnculos, problemas al hígado (colestasis), lupus eritematoso, mayor crecimiento de las tiroides.

Pueden ocurrir otros efectos no deseados que usualmente no requieren atención médica y que desaparecen con el uso (adaptación del organismo al medicamento). **No obstante si continúan o se intensifican debe comunicarlo a su médico:**

Reacciones cutáneas, alergias (prurito, enrojecimiento, hinchazón de la piel), fiebre de poca intensidad, trastornos en el sentido del gusto, dolor de articulaciones, anemia, aumento o disminución de frecuencia urinaria.

Si usted nota cualquier otro efecto molesto no mencionado consulte a su médico.

8.- FORMA DE ADMINISTRACION:

Úsese este medicamento siguiendo las instrucciones de uso, no use más o con mayor frecuencia que la que su médico indique.

Dosis: La que su médico le indique.

9.- CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no más de 30°C. No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico.
No recomiende este medicamento a otra persona.**