

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
MACROSAN CÁPSULAS 50 mg

REF. N° 7267/08

REG. ISP N° F-3633/05

MACROSAN® (Nitrofurantoína) cápsulas 50 mg

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.
Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

Clasificación Farmacológica: Antiséptico urinario

Condición de venta: Bajo receta médica en Establecimientos tipo A

Composición y Presentación:

Composición:

Cada cápsula contiene:

Nitrofurantoína microcristales 50,0000 mg


Excipientes: Lactosa monohidrato, Lauril sulfato de sodio, Almidón glicolato sódico, Talco, Estearato de magnesio, **Dióxido de titanio.**

Colorantes de la cápsula:

Colorante FD&C rojo N° 40, Colorante FD&C azul N° 1.

Presentación:

Envase de venta: Estuche con 20 y 30 cápsulas.



1.- ¿ Para qué se usa ?

Este medicamento está indicado en el tratamiento de infecciones urinarias producidas por bacterias sensibles demostrado **por** antibiograma

2.- Administración.

Vía oral.

Rango y frecuencia:

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es de:

Adultos: 50 a 100 mg 4 veces al día.

Niños mayores de 1 año: 5 – 7 mg/kg de peso ~~cuatro veces~~ al día, **divididos en 4 dosis.**

El tratamiento debe durar por lo menos una semana.

Debe evitar olvidar alguna toma y respetar los horarios. Si no cumple el tratamiento lo más probable es que la enfermedad se vuelva a presentar con mayor intensidad y este medicamento ya no le servirá para detener la infección.

**FOLLETO DE INFORMACION
AL PACIENTE**

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
MACROSAN CÁPSULAS 50 mg

REF. N° 7267/08

REG. ISP N° F-3633/05

Consejo de cómo administrarlo

Se recomienda que tome el medicamento junto con comida o leche para evitar molestias estomacales.

Uso prolongado.

Debe usarlo durante el tiempo que su médico se lo señale, respetando los horarios y las dosis.
El uso prolongado debe realizarlo bajo control médico periódico.

3.- Precauciones

Mayores de 60 años

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo que debe seguir las indicaciones de su médico durante el tratamiento con Macrosan ®

Consumo de alcohol

Evite el consumo de alcohol mientras está en tratamiento con este medicamento, ya que se aumentan los riesgos de efectos adversos de Macrosan ®

Manejo de vehículos

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

Embarazo.

Este medicamento puede causar daño al feto, usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.

Lactancia

Debe consultar al médico antes de usar este medicamento si está amamantando.

Lactantes y niños

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra.
No se recomienda su uso en lactantes menores de 1 mes, por riesgo de producir anemia hemolítica.

Precauciones especiales

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico


4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos.

- Si ha presentado síntomas de alergia a Nitrofurantoína.
- Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.
- **Si Ud. está embarazada o amamantando.**

5.- Interacciones

Medicamentos.

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: acetohidroxamina, glibenclamida, dapsona, furazolidona, metildopa, procainamida, quinidina, sulfonamidas, vitamina K, carbamazepina, cloroquina, cisplatino, citarabina, vacunas para la difteria,



FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
MACROSAN CÁPSULAS 50 mg

REF. N° 7267/08

REG. ISP N° F-3633/05

tetano y pertussis (DPT), disulfiram, hidroxiclороquina, lindano, sales de litio, mefenitoína, pemolina, fenitoína, piridoxina, vincristina, probenecid, sulfapirazona, quinina, o cualquier otro agente antiinfeccioso.

Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular o cualquier otra enfermedad crónica o severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenosa, enfermedad pulmonar o daño neurológico

Exámenes de Laboratorio

Macrosan ® puede causar falsos resultados en exámenes de azúcar en orina, por lo que debe avisar que se encuentra en tratamiento con este medicamento antes de realizarse algún examen

6.- Efectos Adversos.

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: dolor de pecho, escalofríos, congestión, fiebre, mareos, somnolencia, dificultad para respirar, rubor en la cara o boca, úlceras en la garganta, debilidad inusual, fatiga inusual, debe acudir de inmediato a su médico o al centro asistencial más cercano, llevando el envase del medicamento.

Otros efectos.

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo, consulte al médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos, pérdida del apetito.

7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: náuseas severas, vómitos, diarrea, pérdida del apetito. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.

8.- Condiciones de Almacenamiento.

Mantener lejos del alcance de los niños. Mantener en su envase original, protegido del calor, luz y humedad a temperaturas inferiores a los **25° C**

- No usar este medicamento después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.
- No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico.
- No recomiende este medicamento a otra persona.

*Elaborado y distribuido en Chile por Instituto Sanitas S.A.
Avda. Américo Vespucio 01260 - Quilicura, Santiago
www.sanitas.cl*

