

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

LAUNOL LOCIÓN

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su médico.

Composición y Presentación:

Launol Loción

Cada 100 mL de loción contiene:

Decametrina : 0,02 %

Piperonil butóxido : 2,50 %

Excipientes: **Incluir listado cualitativo de acuerdo a última fórmula autorizada en el registro sanitario.** ~~Alcohol Benílico, Alcohol de Lanolina Acetilada, Esencia de Bergamota sintética, Glicerilo monoestearato, Metil Glucosa Etoxilada, Polietilenglicol Sesquiostearato de Metil glucosa, Sesquiostearato de metil glucosa, Isopropilo miristato, Propilenglicol Vasolina líquida, Agua purificada e.s.p.~~

Indicaciones:

Tratamiento de la Pediculosis humana causada por el pediculus humanus variedad capitis (piojos de la cabeza) y sus huevos.

~~Las piretrinas asociadas con piperonil butóxido se usan para el tratamiento tópico de pediculosis (infestación por piojos) y de la escabiasis (sarna). Se recomienda su uso especialmente en lactantes, niños menores y mujeres en estado de embarazo o lactancia, dado el elevado potencial tóxico del lindano.~~

~~Si se usa correctamente, 1-3 tratamientos son usualmente 100 % efectivos para erradicar la infestación por piojos o la sarna. Se recomienda, asimismo, el tratamiento conjunto de toda la familia para prevenir recaídas.~~

~~Las infecciones leves, secundarias a la parasitosis, remiten habitualmente, pero puede ser necesaria una terapia sistémica anti infecciosa en caso de infecciones secundarias severas.~~

Clasificación:

Pediculicida. Escabicida.

Contraindicaciones:


Si se presenta irritación primaria o hipersensibilidad en pacientes que usen piretrinas con piperonil butóxido, se debe discontinuar el tratamiento, eliminar la droga lavando la zona implicada y consultar al médico.

Embarazo, Lactancia.

Menores de 2 años.

Interacciones:

**FOLLETO DE INFORMACIÓN
AL PACIENTE**



FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

LAUNOL LOCIÓN

No existen interacciones en bibliografía consultada.

Reacciones Adversas:

Cuando se usan en dosis apropiadas, las combinaciones de piretrinas con piperonil butóxido parecen tener un índice muy bajo de toxicidad.

Pueden ocurrir:

- irritación local, incluyendo eritema, prurito, urticaria, edema, eczema y erosión corneal leve.

Debe evitarse el contacto con la cara, ojos, membranas mucosas y meato uretral.

Aunque las piretrinas han sido informadas alérgicas por contacto, la sensibilización ocasional caracterizada por dermatitis, se han debido probablemente a impurezas de las flores de pyrethrum. Sin embargo, las preparaciones a base de decametrina, es poco probable que puedan causar sensibilización de la piel.

Precauciones:

Las piretrinas con piperonil butóxido no deben administrarse oralmente o ser inhaladas. Tampoco deben usarse cerca de los ojos o permitir que entren en contacto con las membranas mucosas.

No debe aplicarse en piel con inflamación aguda o en superficies lesionadas.

Los envases de loción de piretrina con piperonil butóxido deben agitarse antes de usar.

Dosis y modo de empleo:

Lociones que contienen piretrinas con piperonil butóxido se aplican tópicamente.

Para el tratamiento de la pediculosis se debe aplicar abundante loción (Launol Loción), para cubrir la parte pilosa afectada y las áreas adyacentes, teniendo cuidado de evitar el contacto con la cara (ojos, pestañas o membranas mucosas) y meato uretral. Después de 10-15 minutos, se debe lavar el pelo cuidadosamente con champú corriente o agua, secar con una toalla limpia y peinar con peineta de dientes finos para remover los huevos de piojos. Repetir este tratamiento por 3 días consecutivos y una vez más después de una semana.

~~Para el tratamiento de la sarna se debe aplicar la loción en la noche por todo el cuerpo (excepto cara) y dejar hasta la mañana siguiente. Tomar en la misma noche un baño de aseo normal. Repetir este tratamiento por tres noches seguidas y repetir después de una semana. Para la erradicación total de la sarna se recomienda tratar todo el grupo de habitantes de la casa.~~

~~Aunque habitualmente el primer tratamiento con piretrinas y piperonil butóxido es exitoso, el tratamiento debe repetirse después de 7-10 días para eliminar posibles piojos reincubados o rebrotes de la sarna.~~

~~Toda vestimenta y ropa de cama que pudiera haber sido contaminada por el paciente dentro de los 2 últimos días debe lavarse en agua caliente.~~

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
LAUNOL LOCIÓN

Sobredosis:

Si la droga entra en contacto con los ojos, estos deben lavarse completamente con agua. La ingestión de hasta 50 mg de piretrinas no produce efectos tóxicos. En animales, dosis mayores orales, inhaladas o tópicas de piretrinas ha producido excitación de SNC, incoordinación, temblores, ataques y muerte. Se ha informado de náuseas, vómitos, diarrea, depresión del SNC y enteritis hemorrágica cuando se ingieren cantidades mayores de piperonil butóxido. Para minimizar la absorción de piretrinas y piperonil butóxido luego de su ingestión, debe efectuarse inmediatamente un lavado gástrico y administrar catárticos salinos. El tratamiento por sobredosis incluye principalmente cuidado de apoyo y sintomático.

En caso de aparecer síntomas de sobredosis, trasladar al paciente, junto con este folleto, a un establecimiento asistencial para observación o para el tratamiento de los síntomas y control de los signos vitales.

Condiciones de Almacenamiento:

Mantener lejos de alcance de los niños; en su envase original; protegido del calor; la luz y la humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. Almacenar a temperatura ambiente.

NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN INDICACION MEDICA
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA.

kg/lzc 01.13

FOLLETO DE INFORMACIÓN
AL PACIENTE