



FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE CALCEFORD FORTE CAPSULAS

Composición y presentación:

Cada cápsula contiene:

Carbonato de Calcio (equivalente a 500 mg de calcio elemental) 1.250 mg Colecalciferol (equivalente a 400 U.I. de Vitamina D3) 4mg

Excipientes: Polividona, almidón glicolato de sodio, lauril sulfato de sodio, estearato de magnesio, lactosa monohidrato, cápsula de gelatina, colorante FD&C azul N° 1, colorante FD&C rojo N° 40, colorante FD&C amarillo N° 6, dióxido de titanio, colorante FD&C amarillo N° 5.

Indicaciones:

Este medicamento se usa para tratar o prevenir ciertas enfermedades debidas a la carencia de calcio asociada a un déficit de vitamina D. Como coadyuvante en la reparación de fracturas óseas y en el tratamiento de la osteoporosis senil.

Clasificación:

Agente antihipocalcémico.

Advertencias:

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica. El consumo en exceso de alcohol, tabaco y café puede disminuir la absorción de calcio.

Contraindicaciones:

Usted no debe usar este medicamento en las siguientes condiciones:

- Antecedentes de alergia o hipersensibilidad a este medicamento.
- Hipercalcemia (exceso de calcio en la sangre).
- Insuficiencia renal grave, litiasis renal (cálculos renales).
- Fibrilación ventricular preexistente (enfermedad cardíaca).



Interacciones:

Los medicamentos pueden interferir entre ellos, aumentando, disminuyendo o anulando el efecto de ellos. Ud., debe informar a su médico o farmacéutico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con los siguientes productos:

- Con tetraciclina, fluoruros, cimetidina, famotidina o ranitidina no debe ser administrado simultáneamente, ya que el calcio puede disminuir la absorción de estos medicamentos, la toma de calcio debe ir separada al menos de 3 horas respecto a la de estos medicamentos.
- Con dosis elevadas de diuréticos tiazídicos (por ej.: hidroclorotiazida) puede producirse hipercalcemia.

- La administración conjunta de este medicamento puede aumentar la absorción de aluminio, magnesio o fosfatos presentes en otros medicamentos (por ej.: antiácidos) - El uso de medicamentos que contengan estrógenos (por ej.: anticonceptivos orales) puede aumentar la absorción del calcio.

Con anticonvulsivantes (por ej.: fenobarbital, primidona, fenitoína) los niveles de vitamina D en la sangre pueden verse disminuidos.

- La administración de calcio en pacientes que se encuentren en tratamiento con glucósidos digitálicos (por Ej.: digoxina) puede aumentar los efectos tóxicos del digitálico (aparición de arritmias).

- Pueden disminuir los efectos de medicamentos antihipertensivos como nifedipino, nitrendipino, verapamilo.

- Con colestiramina, colestipol o vaselina líquida, puede disminuir la absorción de vitamina D

Efectos indeseables:

El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos que normalmente no requieren atención médica.

- Excepcionalmente pueden presentarse algunas molestias gastrointestinales como flatulencia, eructos, náuseas, constipación o diarrea, especialmente en personas de edad avanzada.

Reacciones adversas:

Si usted presenta alguna de las siguientes reacciones adversas mientras esté en tratamiento con este producto, acuda a un médico.



- La aparición de los siguientes síntomas pueden estar asociada a una hipercalcemia: constipación severa, sequedad de la boca, continuo dolor de cabeza, aumento de la sed, irritabilidad, pérdida del apetito, depresión mental, alteración del gusto (sabor metálico), cansancio inusual, debilidad, confusión, somnolencia, aumento de la presión sanguínea, hipersensibilidad a la luz (ojos o piel) especialmente en pacientes hemodializados, alteración del ritmo cardíaco (aumento, disminución o irregularidad), náuseas y vómitos continuos, aumento del volumen de orina o de la frecuencia urinaria. Pueden desarrollarse cálculos renales o calcificación caracterizados por dificultad o dolor al orinar.

Precauciones:

Evitar el uso simultáneo con ciertos alimentos con alto contenido de fibra, como salvado, pan y cereales integrales; no consumir estos alimentos en el lapso de 1 o 2 horas anterior o posterior a la administración de suplementos de calcio. Evitar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, tabaco y bebidas que contengan cafeína. Este medicamento puede aumentar la probabilidad de estitquez o hemorroides en pacientes sensibles.

Se debe tener precaución en pacientes con historial de cálculos renales.

Dosis:

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante, la dosis usual recomendada es:

- Una cápsula al día.
- Dosis máxima: 3 cápsulas al día, por un período limitado

Modo de empleo:

Las cápsulas se deben tragar enteras, sin masticar y con un vaso lleno de agua. No tomar en lo posible en el lapso de 1 a 2 horas respecto a la ingesta de otros medicamentos.

Sobredosis:

No se ha informado de sobredosis aguda accidental, sin embargo en caso de aparición de síntomas de hipercalcemia (Véase reacciones adversas) deberá acudir al centro asistencial más cercano llevando este folleto.

Tratamiento: En caso de sobredosis se debe suspender de inmediato el medicamento, suministrar una dieta baja en calcio; rehidratar al paciente y en función de la gravedad de la intoxicación podrá emplearse tratamiento sintomático.



Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor, la humedad y la luz.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico.

No recomiende este medicamento a otra persona.