



LABORATORIOS ANDROMACO S.A.


ROTULADO GRAFICO**ELCAL FORTE CÁPSULAS 450 mg****ESTUCHE ENVASE VENTA PÚBLICO****Cara N°1:****ELCAL FORTE**

Calcio 450 mg

X cápsulas

Laboratorios Andrómaco S.A.

Vía oral

**Cara N°2:****ELCAL FORTE**

Cada cápsula contiene:

Calcio 450 mg

(Como carbonato de Calcio)

Excipientes: polividona, laurilsulfato de sodio, dióxido de silicio coloidal, almidón glicolato sódico, colorante FD&C azul N°1, colorante FD&C rojo N°40, dióxido de titanio, colorante FD&C amarillo N°5, óxido de hierro negro, c.s.

Reg. I.S.P. N° F-920/08

Cara N°3:

Recomendación de uso: Este medicamento está indicado como Suplemento en estados carenciales ~~o de mayores requerimientos de calcio en niños y adolescentes, embarazo y lactancia. Coadyuvante en la prevención de la osteoporosis, fracturas en ancianos, desmineralización postmenopáusica, cuadros de disminución del rendimiento neuromuscular y calambres musculares.~~

Administración y dosis vía oral: la dosis usual para adultos es de 1 a 2 cápsulas al día. No administrar a niños menores de 12 años sin indicación médica. ~~es de acuerdo a los requerimientos diarios, según su condición (ver folleto interno).~~ No debe tomar el calcio en forma conjunta con otros medicamentos (especialmente: tetraciclina, fluoruros, cimetidina, ranitidina, famotidina). Debe tomarlo 1 a 2 horas después de haber ingerido el otro medicamento. La mayoría de los suplementos de calcio deben ser tomados con las comidas. Se recomienda que tome el medicamento con un vaso lleno de agua o jugo. **Uso prolongado:** A pesar de que el calcio y la vitamina D son necesarios para el organismo un consumo excesivo o por un periodo prolongado de este medicamento sin control periódico de su médico, puede conducir a efectos dañinos severos sobre su salud.



LABORATORIOS ANDROMACO S.A.

ROTULADO GRAFICO**ELCAL FORTE CÁPSULAS 450 mg**

Precauciones y advertencias:- Consumo de alcohol: No consuma grandes cantidades de alcohol, café y tabaco, durante el tratamiento con calcio, ya que estos pueden disminuir la absorción del medicamento. – **Embarazo:** Es muy importante que ingiera calcio durante el embarazo, pero un exceso de este suplemento puede ser dañino para la madre y / o el feto. El uso de este medicamento durante el embarazo y lactancia debe ser bajo prescripción médica.- **Lactancia:** Es muy importante que ingiera calcio durante el periodo de lactancia, pero un exceso de este suplemento puede ser dañino para la madre y / o el lactante.- **Precauciones especiales:** Recuerde que la cantidad total de calcio que usted consume cada día incluye la de los alimentos, además del proveniente de este suplemento. No ingiera otros medicamentos o suplementos que contengan grandes cantidades de calcio, fosfato o vitamina D, a menos que su médico lo indique.

Contraindicaciones: Si ha presentado síntomas de alergia al carbonato de calcio. Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

Efectos adversos: Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: mareos, sensación de calor, arritmias, náuseas, vómitos, sudoración, debilidad, constipación severa, sed, gusto metálico, boca seca, irritabilidad, pérdida del apetito, ritmo cardíaco irregular, dificultad par orinar.

Para mayor información lea el folleto interno, si tiene dudas consulte a su médico o farmacéutico.

Manténgase fuera del alcance de los niños, en lugar fresco y seco, a no más de 25°C.


No administrar junto con tetraciclinas porque puede inactivarlas.

No exponer a la luz.

Venta Directa en Establecimientos tipo A y B

Cara N°4:

Elaborado y distribuido en Chile por
Laboratorios Andrómaco S.A.
Av. Quilín 5273, Peñalolén, Santiago

**Aleta superior:**

ELCAL FORTE
Calcio 450 mg

X cápsulas

Aleta inferior:

Serie:

Vence:



LABORATORIOS ANDROMACO S.A.

ROTULADO GRAFICO

ELCAL FORTE CÁPSULAS 450 mg

BLISTER ENVASE VENTA PUBLICO

ELCAL FORTE

Calcio 450 mg


Cápsulas

Laboratorios Andrómaco S.A.

Serie:

Vence:

Reg. I.S.P. N° F-920/08





LABORATORIOS ANDROMACO S.A.

ROTULADO GRAFICO**ELCAL FORTE CÁPSULAS 450 mg****ESTUCHE ENVASE MUESTRA MÉDICA****Cara N°1:****ELCAL FORTE**

Calcio 450 mg

X cápsulas

Muestra médica – Prohibida su venta

Laboratorios Andrómaco S.A.

Vía oral

Cara N°2:**ELCAL FORTE**

Cada cápsula contiene:

Calcio 450 mg

(Como carbonato de Calcio)


Excipientes: polividona, laurilsulfato de sodio, dióxido de silicio coloidal, almidón glicolato sódico, colorante FD&C azul N°1, colorante FD&C rojo N°40, dióxido de titanio, colorante FD&C amarillo N°5, óxido de hierro negro, c.s.

Reg. I.S.P. N° F-920/08

Cara N°3:

Recomendación de uso: Este medicamento está indicado como Suplemento en estados carenciales ~~o de mayores requerimientos de calcio en niños y adolescentes, embarazo y lactancia. Coadyuvante en la prevención de la osteoporosis, fracturas en ancianos, desmineralización postmenopáusica, cuadros de disminución del rendimiento neuromuscular y calambres musculares.~~

Administración y dosis vía oral: la dosis usual para adultos es de 1 a 2 cápsulas al día. No administrar a niños menores de 12 años sin indicación médica. ~~es de acuerdo a los requerimientos diarios, según su condición (ver folleto interno).~~ No debe tomar el calcio en forma conjunta con otros medicamentos (especialmente: tetraciclina, fluoruros, cimetidina, ranitidina, famotidina). Debe tomarlo 1 a 2 horas después de haber ingerido el otro medicamento. La mayoría de los suplementos de calcio deben ser tomados con las comidas. Se recomienda que tome el medicamento con un vaso lleno de agua o jugo. **Uso prolongado:** A pesar de que el calcio y la vitamina D son necesarios para el organismo un consumo excesivo o por un periodo prolongado de este medicamento sin control periódico de su médico, puede conducir a efectos dañinos severos sobre su salud.





LABORATORIOS ANDROMACO S.A.

ROTULADO GRAFICO**ELCAL FORTE CÁPSULAS 450 mg**

Precauciones y advertencias:- Consumo de alcohol: No consuma grandes cantidades de alcohol, café y tabaco, durante el tratamiento con calcio, ya que estos pueden disminuir la absorción del medicamento. – **Embarazo:** Es muy importante que ingiera calcio durante el embarazo, pero un exceso de este suplemento puede ser dañino para la madre y / o el feto. El uso de este medicamento durante el embarazo y lactancia debe ser bajo prescripción médica.- **Lactancia:** Es muy importante que ingiera calcio durante el periodo de lactancia, pero un exceso de este suplemento puede ser dañino para la madre y / o el lactante.- **Precauciones especiales:** Recuerde que la cantidad total de calcio que usted consume cada día incluye la de los alimentos, además del proveniente de este suplemento. No ingiera otros medicamentos o suplementos que contengan grandes cantidades de calcio, fosfato o vitamina D, a menos que su médico lo indique.

Contraindicaciones: Si ha presentado síntomas de alergia al carbonato de calcio. Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

Efectos adversos: Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: mareos, sensación de calor, arritmias, náuseas, vómitos, sudoración, debilidad, constipación severa, sed, gusto metálico, boca seca, irritabilidad, pérdida del apetito, ritmo cardíaco irregular, dificultad par orinar.

Para mayor información lea el folleto interno, si tiene dudas consulte a su médico o farmacéutico.

Manténgase fuera del alcance de los niños, en lugar fresco y seco, a no más de 25°C.


No administrar junto con tetraciclinas porque puede inactivarlas.

No exponer a la luz.

Venta Directa en Establecimientos tipo A y B

Cara N°4:

Elaborado y distribuido en Chile por
Laboratorios Andrómaco S.A.
Av. Quilín 5273, Peñalolen, Santiago

**Aleta superior:**

ELCAL FORTE
Calcio 450 mg

X cápsulas

Aleta inferior:

Serie:

Vence:



LABORATORIOS ANDROMACO S.A.

ROTULADO GRAFICO

ELCAL FORTE CÁPSULAS 450 mg

BLISTER ENVASE MUESTRA MEDICA

ELCAL FORTE

Calcio 450 mg

Cápsulas

Muestra médica – Prohibida su venta

Laboratorios Andrómaco S.A.

Serie:

Vence:

Reg. I.S.P. N° F-920/08

