

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponde exactamente al indicado por su médico.

1.- COMPOSICION Y PRESENTACION

Cada 100 ml de la solución contiene:

Pargeverina clorhidrato 0,5 g

Excipientes c.s.

Vía de administración : Oral

Presentación: Frasco gotario plástico con X ml de solución para gotas orales

Excipientes: Metilparabeno, propilparabeno, zarina sódica, cloruro de sodio, sacarosa, ácido clorhídrico 1N para ajuste de pH, propilenglicol, agua purificada c.s.p.

2.- CLASIFICACION: Antiespasmódico

3.- INDICACIONES:

Tratamiento de todos los síndromes viscerales agudos y cuyo principal componente es el espasmo muscular con asiento en cualquier porción del tracto digestivo o del aparato hepatobiliar, urinario o genital femenino.

4.- ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Antes de usar este medicamento debe sopesarse los riesgos y los beneficios en su uso, los que deben ser discutidos entre Usted y su médico. Principalmente debe considerar los aspectos siguientes.

- Alergias:** Usted debe comunicar a su médico si alguna vez ha presentado una reacción alérgica a este medicamento o a alguna otra sustancia, ya sea alimentos, preservantes, colorantes, saborizantes u otros medicamentos.
- Embarazo:** Usted debe comunicar a su médico si está embarazada o planea estarlo. No se recomienda su uso durante el embarazo, especialmente su uso durante el primer trimestre.
- Lactancia:** Usted debe conversar con el médico acerca de la conveniencia del uso de este producto mientras esté amamantando. No se recomienda su uso durante la lactancia.
- Niños:** No se debe usar en recién nacidos prematuros.
- Ancianos:** se recomienda especial precaución porque podría precipitarse un cuadro de glaucoma no diagnosticado.
- Test de secreción gástrica:** este medicamento puede interferir en la evaluación de la secreción ácida gástrica, antagonizando los efectos de la pentagastrina y de la histamina, por lo que no se recomienda administrar dentro de las 24 horas previas a la realización de este test.

5.- CONTRAINDICACIONES

- Embarazo y lactancia
- Hipersensibilidad al principio activo o a los excipientes del producto.
- Glaucoma
- Retención urinaria causada por enfermedades prostáticas.
- Estenosis (estrechez) del píloro.

6.- INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

el efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (interacciones). Usted debe comunicar a su médico o farmacéutico de todos los medicamentos que está tomando ya sea con o sin receta médica antes de usar este fármaco

Pueden presentarse interacciones con los siguientes medicamentos: Antiácidos o antidiarreicos adsorbentes(ej.: caolín, atapulgita), pueden reducir la absorción de este medicamento, por lo que es necesario que su administración oral esté separada al menos 2 – 3 horas de este último.

Medicamentos con actividad anticolinérgica como por ejemplo antidepresivos tricíclicos(ej.: imipramina, maprotilina) o inhibidores de la monoaminooxidasa, antihistamínicos(excepto astemizol, cetirizina, loratadina y terfenadina), quinidina, neurolépticos, benzotropina, beperidina, buclizina, carbamazepina, ciclizina, clozapina, ciclobenzaprina, digoxina, disopiramida, dronabinol, etopropazina, meclizina, olanzapina, oxibutinina, fenotiazina, pimozida, procainamida, prociclidina, tioxantenos, trihexifenidilo, podrían sumar sus efectos a los de este medicamento, existiendo la posibilidad de íleo paralítico(obstrucción resultante de la inhibición del movimiento intestinal)

- Antimiasténicos(ej.: neostigmina)
- Ciclopropano(no se recomienda su uso conjunto)
- Haloperidol o bromperidol(la efectividad de estos medicamentos puede disminuir en pacientes esquizofrénicos)
- Ketoconazol(administrar con al menos dos horas de diferencia con este medicamento, por posible interferencia en su absorción)
- Metoclopramida(puede antagonizar la acción de pargaverina)
- Analgésicos opiáceos(ej.: morfina, codeína, etc.), puede aumentar el riesgo de una constipación severa y/o retención urinaria.

7.- PRESENCIA DE OTRAS ENFERMEDADES

El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos.

Usted debe comunicar a su médico si padece de alguna enfermedad, particularmente en los casos siguientes:

Glaucoma, retención de orina en caso de enfermedades prostáticas, estenosis del píloro (ver N°5.- **contraindicaciones**)

8.- REACCIONES ADVERSAS

Puede ocurrir efectos no deseados que usualmente no requieren atención médica y que desaparecen con el uso (adaptación del organismo al medicamento). No obstante si continúan o se intensifican debe comunicarlo a su médico: sequedad en la boca, constipación.

Si usted nota cualquier otro efecto molesto no mencionado consulte a su médico.

9.- FORMA DE ADMINISTRACION

Use este medicamento siguiendo las instrucciones de uso, no use más o con mayor frecuencia que la que su médico le indique.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad, a no más de 30°C

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.

