

Santiago, 2015

A quien corresponda

Ref: ESTABILIDAD de la SOLUCIÓN UNA VEZ DILUIDA EN SUERO

De nuestra mayor consideración.

A través de la presente, deseamos confirmar a ustedes que el producto que se detalla a continuación es exclusivo de **Pharma Investi de Chile S.A.**, cuenta con la debida autorización registro ISP, para su importación y distribución dentro de nuestro país.

- Recomendaciones almomento de administrar VIADIL Compuesto: Cada dosis está constituida por las ampollas numeradas ly II.
- Utilizar una jeringa común de vidrio o plástico, con aguja para inyección LM. o LV..
- Todo el material debe estar esterilizado.
- Cargar en la misma jeringa una ampolla 1 y una ampolla II, puede aspirarse
- indistintamente primero el contenido de la ampolla loel de la ampolla IL Aplicar indistintamente porvía l.M.o.I.V.(lenta), según indicación médica.
- La inyección LV. debe efectuarse en '-bolo" (lenta) y no utilizando tubuladuras de perfusión.

Sin otro particular, saluda muy atentamente

CARMEN VASQUEZ I. / MARIANO ERAZO

REPRESENTANTE LEGAL

PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.