


VIADIL COMPUESTO



VIADIL COMPUESTO, está constituido por la asociación de Propinoxato (espasmodítico) con ^{acetaminof.} ~~dipirone~~ magnésica (analgésico).

Indicaciones y Uso Clínico:

VIADIL Compuesto está indicado en la terapéutica de los síndromes espasmódicos y/o dolorosos de origen gastrointestinal, hepatobiliar, de las vías urinarias y aparato genital femenino:

Origen Gastrointestinal: Cólicos intestinales, entero-colitis, colopatías (funcional, espasmódica, irritable).

Vías Biliares: Disquinexias y colicistopatías en general.

Vías urinarias: Cólicos nefríticos, espasmos dolorosos (centrales, vesicales), disurias y cistitis. Está indicado cuando se debe efectuar una exploración instrumental de las vías urinarias.

Aparato genital femenino: Dismenorrea funcional, tensión premensual y procesos anexiales dolorosos, sedo abreviación del aparato.


Contraindicaciones:

Debe evitarse el empleo de VIADIL Compuesto en pacientes que padezcan de úlcera gástrica en actividad o presente hemorragia digestiva alta de origen gástrico.

Está contraindicado en pacientes con uropatía obstructiva por hipertrofia prostática, obstrucción intestinal, acalasia, estenosis pilórica, ileo paralítico, atonía intestinal, megacolon tóxico, colitis ulcerosa grave o miastenia gravis.

Precauciones:

Debe administrarse con precaución en pacientes con glaucomas, hipertrofia prostática, colitis ulcerosa, hipertiroidismo, enfermedad coronaria, neuropatías, insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias e hipertensión arterial y



falla renal o hepática.

Precaución en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a la dipirona o susceptibles de manifestar discrasias sanguíneas.

Interacciones Medicamentosas:

Precaución con el empleo en pacientes medicados con clorpromazina.

Efectos Secundarios:

VIADIL Compuesto carece de efectos colaterales a dosis terapéuticas.

Síntomas y Tratamiento de Dosis Excesiva:

Aunque se carece de antecedentes por tratarse de un medicamento poco tóxico, sobre dosis importantes podrían ocasionar sequedad de boca, visión borrosa, taquicardia, dificultad miccional de síntomas todos reversibles con la supresión del fármaco y el tratamiento sintomático de los mismos.

Vías de Administración y Posología:

Vías: oral o parenteral.

Posología: Vía oral

VIADIL Compuesto grageas: Adultos y niños mayores de 12 años: 1 o 2 grageas 3 a 5 veces al día.

VIADIL Compuesto gotas: (Salvo indicación médica especial):

Adultos y niños mayores de 12 años: 20 a 40 gotas, 3 a 5 veces al día.

Niños hasta 12 años: 2 gotas por año de edad, 3 a 5 veces al día.

Lactantes y niños hasta 2 años: 2 a 4 gotas 3 a 5 veces al día.

Vía Parenteral:

VIADIL Compuesto inyectable: Adultos 1 a 4 ampollas diarias por vía intramuscular o intravenosa. Niños, 1/4 o 1/2 ampolla, según la edad, 3 veces al día.

Presentación:

Viadil Compuesto grageas. Envase con 10 grageas.

Viadil Compuesto inyectable. Envase con 2 ampollas

Viadil Compuesto gotas. Envase con 15 ml.