

DOXITHAL

ANTIBACTERIANO

COMPOSICIÓN

Cada comprimido dispersable contiene 50 mg y 100 mg de Doxiciclina monohidrato.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antibiótico.

INDICACIONES

Tratamiento de las formas graves de acné. Infecciones causadas por gérmenes patógenos sensibles a la doxiciclina.

REACCIONES ADVERSAS

En caso de administración a niños menores de 8 años, coloración anormal y permanente de los dientes y desarrollo insuficiente del esmalte dental. Posibles disturbios digestivos: Náuseas, dolores de estómago, diarrea, pérdida del apetito, inflamación de la lengua, inflamación del intestino, candidiasis anogenital. Fotosensibilización.

PRECAUCIONES

Mujeres embarazadas, en período de lactancia y niños menores de 8 años, administrar bajo vigilancia médica, por efectos adversos de las tetraciclinas en el crecimiento óseo y decoloración permanente de los dientes. Evitar exposición directa a la luz. En casos de sobredosis existe peligro de daño hepático y/o renal.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en pacientes con hipersensibilidad a las tetraciclinas o con trastornos graves de la función hepática.

POSOLOGÍA

Para el tratamiento sistémico del acné vulgaris, la dosis usualmente recomendada es la siguiente: Tratamiento de ataque: 100 mg/día durante 10 a 15 días. Tratamiento de mantención: 50 mg/día, por 6 a 12 semanas.

PRESENTACIONES

Envase conteniendo 20 comprimidos dispersables de 50 mg.

Envase conteniendo 10 comprimidos dispersables de 100 mg.