

Tramal Long Tramadol Clorhidrato 200 mg- Caja x 10 Comprimidos



TRAMAL LONG
Laboratorio: GRÜNENTHAL

Drogas:

- Tramadol

Acciones:

- Sistema Nervioso Central: Analgésicos Narcóticos



Acciones:

- **Comprimidos 50 mg:** cada comprimido recubierto de liberación prolongada contiene: Tramadol Clorhidrato 50 mg. **Comprimidos 100 mg:** cada comprimido recubierto de liberación prolongada contiene: Tramadol Clorhidrato 100 mg. **Comprimidos 150 mg:** cada comprimido recubierto de liberación prolongada contiene: Tramadol Clorhidrato 150 mg. **Comprimidos 200 mg:** cada comprimido recubierto de liberación prolongada contiene: Tramadol Clorhidrato 200 mg.
- Analgésico.
- Tratamiento del dolor moderado a severo.
- La dosis debe ser ajustada de acuerdo a la intensidad del dolor y a la sensibilidad del paciente. A menos que se prescriba de manera diferente, Tramal Long debe administrarse como sigue: **Adultos y adolescentes mayores de 16 años de edad:** la dosis inicial usualmente es de 50-100 mg 2 veces al día, de preferencia en la mañana y en la noche. Si el alivio del dolor no es adecuado, la dosis puede aumentarse a 150 mg ó 200 mg 2 veces al día. Debe usarse la dosis más baja analgésicamente efectiva. La dosis diaria no debe ser superior a 400 mg. El intervalo de dosis no debe ser menor a 8 horas. **Niños:** Tramal Long no es adecuado para niños. **Pacientes geriátricos:** generalmente no es necesario un ajuste de dosis en pacientes de edad avanzada (hasta 75 años) sin una manifiesta insuficiencia hepática o renal. En pacientes ancianos (sobre 75 años) la eliminación puede estar prolongada. Por lo tanto, en caso necesario los intervalos de dosis pueden ser ampliados de acuerdo a los requerimientos del paciente, en general no debe sobrepasarse los 300 mg diarios. **Insuficiencia hepática y renal/diálisis:** en pacientes con insuficiencia renal y/o hepática severa no debe administrarse Tramal Long. En casos no severos debe considerarse una prolongación del intervalo de dosificación, utilizando la menor dosis posible. No sobrepasar los 200 mg diarios en pacientes con clearance de creatinina de 10 a 30 ml/min. En pacientes con insuficiencia hepática no severa, deberá usarse la dosis mínima posible, ampliando el intervalo de dosificación. La experiencia en pacientes dializados ha demostrado que el tramadol sólo es removido muy lentamente por hemodiálisis o hemofiltración. Generalmente no es necesaria una dosificación post-diálisis para mantener la analgesia. Los comprimidos de liberación prolongada deben tragarse enteros, no divididos o masticados, con líquido suficiente e independiente de las comidas. Tramal Long no debe ser administrado por un tiempo mayor que el terapéutico y absolutamente necesario. Si se requiere un tratamiento a largo plazo, se deben realizar chequeos a intervalos regulares y breves (si es necesario con interrupciones del tratamiento) para evaluar si es necesario continuar con el tratamiento y en qué dosis. Las dosis recomendadas son una pauta. En principio debe usarse la dosis más baja analgésicamente efectiva. En el tratamiento del dolor crónico se recomienda un esquema fijo de dosificación.
- **Comprimidos 50 mg:** envases conteniendo 10 y 20 comprimidos recubiertos de acción prolongada. **Comprimidos 100 mg:** envase conteniendo 10 comprimidos recubiertos de acción prolongada. **Comprimidos 150 mg:** envase conteniendo 10 comprimidos recubiertos de acción prolongada. **Comprimidos 200 mg:** envase conteniendo 10 comprimidos recubiertos de acción prolongada.