



FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE ZILFIC® COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 100 mg



0739 6694



0739 6694

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su Médico o Químico Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponde exactamente al indicado por su Médico.

Composición:

Cada comprimido recubierto contiene:
Sildenafil (como Citrato) 100 mg

Excipientes: Polividona, Croscarmelosa Sódica, Lactosa Monohidrato, Estearato de Magnesio, Celulosa Microcristalina, Colorante FD&C Azul N° 2 - Laca, Alcohol Polivinílico Parcialmente Hidrolizado, Dióxido de Titanio, Macrogol 3000, Talco Venecia.

Clasificación:

Agente terapéutico para la disfunción eréctil en el hombre.

Indicación:

Está indicado para el tratamiento de la disfunción eréctil.

Advertencias: Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica.

- Se debe determinar con anterioridad la situación cardíaca del paciente.
- No se recomienda su uso en pacientes con deformidades anatómicas penianas o patologías que predisponen del priapismo.
- Este medicamento puede causar en casos aislados pérdida repentina de la visión, condición conocida como neuropatía óptica isquémica no arterítica. Si Ud. presenta manera súbita pérdida de la visión en uno o ambos ojos, debe solicitar de manera inmediata atención médica. Debe informar, además a su médico si Ud. ha presentado previamente esta sintomatología.

Contraindicaciones:

No usar en pacientes que presenten:

- Deformidades anatómicas penianas como: Fibrosis Cavernosa, calcificación o angulación.
- Desórdenes de sangramiento como úlcera péptica o defectos en la coagulación.
- Falla cardíaca, angina inestable, hipertensión o hipotensión, arritmias, infarto al miocardio.
- Enfermedad hepática o cirrosis.
- Mielomas o leucemia.
- Priapismo, trombocitopenia.
- Enfermedad de la función renal.
- Retinitis pigmentosa.

- Hipersensibilidad a la droga o a alguno de los componentes de la formulación.
- Pacientes en tratamiento con medicamentos que contienen Nitratos o aporten Óxido Nítrico (Isosorbide Dinitrato, Isosorbide Mononitrato, Nitroglicerina, Nitrato de Amilo, Tetrinitrato de Eritrilo, Nitroprusiato de Sodio) por riesgo de hipotensión arterial severa.

Reproducción

Una dosis de 100 mg no demostró afectar la movilidad o motilidad de los espermios.

Interacciones:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (Interacciones). Ud. debe comunicar a su Médico o Farmacéutico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta médica, **antes de usar este fármaco**, especialmente si se trata de: drogas antihipertensivas (aumenta el efecto hipotensor), inhibidores de la enzima hepática del citocromo P450 como Cimetidina, Eritromicina, Itraconazol, Ketoconazol, Mebendazol, Ritonavir, Saquinavir (aumenta la concentración de Sildenafil en la sangre), Nitratos, Nitroglicerina (se potencia el efecto hipotensor), Inductores de la enzima hepática del citocromo P450 como Rifampicina (disminuye la concentración en la sangre de Sildenafil).

Reacciones Adversas:

Pueden ocurrir efectos no deseados que usualmente no requieren atención médica y que desaparecen con el uso (adaptación del organismo al medicamento). **No obstante si continúan o se intensifican debe comunicarlo a su Médico:** infarto al miocardio, muerte súbita, arritmia ventricular, hemorragia cerebrovascular, ataque isquémico transiente, especialmente en pacientes con historia de predisposición a riesgos cardiovasculares.

En un 2 - 3% se presentan: visión borrosa, cambios en el color, mareos, infección del tracto urinario. Menos frecuentes se presentan: hematuria (sangre en la orina), diplopía (doble visión), aumento de la presión intraocular, enrojecimiento, ardor en el ojo, sangramiento o enfermedad retinal vascular, erección prolongada, priapismo, náuseas, reacciones alérgicas, anemia o astenia, artrosis, artritis, gota o hiperuricemia, sinovitis o tenosinovitis, entre otros.

Vía de Administración:

Vía oral.

Dosis:

El Médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular. No obstante, la dosis usual recomendada es de 100 mg administrados desde cuatro a media hora antes de la actividad sexual.

Sobredosis:

En caso de sobredosis por ingestión accidental, se deben mantener los signos vitales del paciente y recurrir al Centro Médico más cercano.

Condiciones de Almacenamiento:

Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no más de 30 °C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Paraguay: Almacenar a temperatura ambiente (Entre 15°C y 30°C).



0739 6694

NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA

V4
739669
04.04.19