

Zilfic Sildenafil 50 mg - SILDENAFIL – CAJA X 2 Comprimidos Recubierto





ZILFIC 50 MG Comprimidos Recubiertos

Laboratorio: MINTLAB

Drogas:

- Sildenafil

Acciones:

- Aparato Genito-Urinario: Tratamiento de Disfunciones Sexuales

Acciones:

- Cada comprimido recubierto contiene: Sildenafil (como Citrato) 50 mg. Excipientes: Polividona, Croscarmelosa Sódica, Lactosa Monohidrato, Estearato de Magnesio, Celulosa Microcristalina, Colorante FD&C Azul N° 2 - Laca, Alcohol Polivinílico Parcialmente Hidrolizado, Dióxido de Titanio, Macrogol 3000, Talco Venecia.
- Agente terapéutico para la disfunción eréctil en el hombre.
- Está indicado para el tratamiento de la disfunción eréctil.
- **Vía de administración:** Vía oral. **Dosis:** El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular. No obstante, la dosis usual recomendada es de 100 mg administrados desde 4 a 1/2 hora antes de la actividad sexual.
- Pueden ocurrir efectos no deseados que usualmente no requieren atención médica y que desaparecen con el uso (adaptación del organismo al medicamento). No obstante si continúan o se intensifican debe comunicarlo a su médico: infarto al miocardio, muerte súbita, arritmia ventricular, hemorragia cerebrovascular, ataque isquémico transiente, especialmente en pacientes con historia de predisposición a riesgos cardiovasculares. En un 2-3% se presentan: visión borrosa, cambios en el color, mareos, infección del tracto urinario. Menos frecuentes se presentan: hematuria (sangre en la orina), diplopía (doble visión), aumento de la presión intraocular, enrojecimiento, ardor en el ojo, sangramiento o enfermedad retinal vascular, erección prolongada, priapismo, náuseas, reacciones alérgicas, anemia o astenia, artrosis, artritis, gota o hiperuricemia, sinovitis o tebnosinovitis, entre otros.
- **No usar en pacientes que presenten:** Deformidades anatómicas penianas como: Fibrosis cavernosa, calcificación o angulación. Desórdenes de sangramiento como úlcera péptica o defectos en la coagulación. Falla cardíaca, angina inestable, hipertensión o hipotensión, arritmias, infarto al miocardio. Enfermedad hepática o cirrosis. Mielomas o leucemia. Priapismo, trombocitopenia. Enfermedad de la función renal. Retinitis pigmentosa. Pacientes en tratamiento con medicamentos que contienen nitritos o aporten óxido nítrico (isosorbide dinitrato, isosorbide mononitrato, nitroglicerina, nitrito de amilo. Tetranitrato de eritrilo, nitroprusiato de sodio) por riesgo de hipotensión arterial severa.
- Usese sólo por indicación y bajo supervisión médica. Se debe determinar con anterioridad la situación cardíaca del paciente. No se recomienda su uso en pacientes con deformidades anatómicas penianas o patologías que predisponen al priapismo. Este medicamento puede causar en casos aislados pérdida repentina de la visión, condición



conocida como neuropatía óptica isquémica no arterítica. Si Ud. presenta de manera súbita pérdida de la visión en uno o ambos ojos, debe solicitar de manera inmediata atención médica. Debe informar, además, a su médico si Ud. ha presentado previamente esta sintomatología.

- El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (Interacciones). **Ud. debe comunicar a su médico o farmacéutico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta médica, antes de usar este fármaco, especialmente si se trata de:** drogas antihipertensivas (aumenta el efecto hipotensor), inhibidores de la enzima hepática del citocromo P450 como cimetidina, eritromicina, itraconazol, ketoconazol, mebendazol, ritonavir, saquinavir (aumenta la concentración de sildenafil en la sangre), nitratos, nitroglicerina (se potencia el efecto hipotensor), inductores de la enzima hepática del citocromo P450 como rifampicina (disminuye la concentración en la sangre de sildenafil).
- En caso de sobredosis por ingestión accidental, se deben mantener los signos vitales del paciente y recurrir al centro médico más cercano.
- **Condiciones de almacenamiento:** Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, la luz y la humedad, a no más de 25° C. No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

¿Para qué enfermedades o condiciones se prescribe este medicamento?

Tratamiento de edemas asociados a ICC, edemas de origen medicamentoso y otros cuadros de retención hidrosalina; Tratamiento adyuvante del glaucoma de ángulo abierto y glaucoma 2ario ; Tratamiento preoperatorio del glaucoma agudo de ángulo cerrado; Tratamiento adyuvante de la epilepsia (petit mal).

¿Qué precauciones debo tener al usar este medicamento?

Administración: Vía oral. Administrar a ser posible en ayunas pero si aparecen náuseas o vómitos administrar con leche o alimentos. Contraindicaciones: Hipersensibilidad a la acetazolamida o sulfamidas; I.H. o I.R. grave; acidosis hiperclorémica; insuf. suprarrenal; 1 er trimestre de embarazo; estados avanzados de hiponatremia o hipokalemia; cirrosis; glaucoma crónico de ángulo cerrado no congestivo.