



FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE NOSCAPINA



Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su Médico o Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponde exactamente al indicado por su Médico.

Composición:

Noscapina Comprimidos 20 mg

Cada comprimido contiene:

Noscapina 20 mg

Excipientes: Almidón Sodio Glicolato, Estearato de Magnesio, Lactosa Monohidrato, Talco, Celulosa Microcristalina.

Noscapina Jarabe 5 mg/5mL

Cada 5 mL de jarabe contiene:

Noscapina 5 mg

(como Clorhidrato Monohidrato)

Excipientes: Ácido Cítrico Anhidro, Metilparabeno, Propilparabeno, Esencia Damasco Líquida, Esencia Naranja Líquida, Colorante FD&C Amarillo N° 6, Sacarosa, Agua Purificada.

Clasificación:

Antitusivo.

Indicación:

Este medicamento es usado para aliviar la tos seca (sin flema) que aparece en el resfriado común o al respirar en atmósferas irritantes (contaminadas).

Importante:

Si Ud. advierte decaimiento extremo, falta de apetito, respiración o llanto dificultoso y fiebre en menores de 3 meses acuda inmediatamente al Médico.

Advertencias y Precauciones:

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica.

- Este medicamento puede provocar somnolencia (sueño), lo que se debe tener en cuenta en personas que manejen vehículos o maquinaria.

- Este medicamento sólo alivia la tos asociada a irritaciones leves de garganta: Ud. debe consultar de inmediato un Médico si observa aparición de flemas, fiebre por más de 2 días, cansancio o dificultad para respirar, sudoración nocturna o cualquier otro síntoma que Ud. considere distinto o exagerado respecto a un resfriado común.
- Ud. no debe usar este medicamento en forma prolongada o repetida sin consultar un Médico.
- En ancianos se debe administrar la mitad de la dosis.
- Se debe tener especial precaución con los ancianos y niños, pues ellos son especialmente sensibles a infecciones respiratorias, aun sin fiebre o tos importante. Se debe conducir inmediatamente al Médico si sufre de cansancio extremo o dificultad para respirar.

Contraindicaciones:

Si su Médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

- Embarazo o lactancia, tampoco en mujeres que planeen o que estén en riesgo de embarazarse.
- Tos asmática o insuficiencia respiratoria (que se caracteriza por cansancio extremo o inusual).
- Alergia a Noscapina.

Interacciones:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros fármacos o alimentos, con consecuencias dañinas para su organismo, por lo que Ud. debe consultar al Farmacéutico si está tomando otros medicamentos, especialmente si se trata de: tranquilizantes o analgésicos potentes. Ud. no debe ingerir alcohol mientras toma este medicamento. No olvide mencionar que está tomando este medicamento, en caso de requerir atención médica por otras razones, o en caso que se someta a algún examen.

Presencia de otras Enfermedades:

El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos. En caso de sufrir alguna enfermedad Ud. debe consultar al Médico o Farmacéutico antes de ingerir este medicamento, en especial en los casos siguientes: Enfermedades Renales o hepáticas, Glaucoma, Asma, Retención urinaria o cualquier otra relación con el sistema respiratorio.

Efectos Adversos (no deseados):

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Consulte inmediatamente al Médico si alguno de estos síntomas ocurre: dificultad para respirar, cansancio o decaimiento anormal, vómitos, fiebre. Otros efectos son temporales y no requieren atención médica, salvo que estos sean muy molestos o se prolonguen en el tiempo: mareos, náuseas.

Forma de Administración:

Vía oral.

Dosis:

Úsese este medicamento siguiendo las instrucciones de uso, no use más o con mayor frecuencia a la que se indica.

Adultos y niños mayores de 12 años: Ingerir 1 a 2 comprimidos cada 6 a 8 horas (3 a 4 veces al día) con un vaso de agua. Tomar 1 cucharada (15 mL) cada 6 a 8 horas (3 a 4 veces al día).

Niños de 2 a 5 años: Tomar 1/2 o 1 cucharadita (2.5 mL a 5 mL) cada 6 a 8 horas (3 a 4 veces al día).

Niños de 6 a 12 años: 1 a 2 cucharaditas (5 a 10 mL) cada 6 a 8 horas.

Sobredosis:

En caso de ingestión involuntaria conduzca inmediatamente al intoxicado a un Centro de Atención Médica Hospitalario.

Condiciones de Almacenamiento:

Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no más de 25 °C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MEDICO
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA**

V3
734853
08.05.13