

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

ATENOLOL COMPRIMIDOS 50 mg

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento: Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su Médico o Químico Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su médico.

COMPOSICION DEL PRODUCTO:

Cada comprimido contiene:

Atenolol 50 mg

Excipientes c.s.: Almidón de maíz, Celulosa Microcristalina PH101, Almidón glicolato de sodio, Talco purificado, Dióxido de silicio coloidal ~~coloidal~~, Estearato de magnesio, Povidona(P.V.P.K30), Lauril Sulfato de sodio, Metilparabeno sódico ~~Parahidroximetilbenzoato de sodio~~, Propilparabeno sódico ~~Parahidroxipropilbenzoato de sodio~~

PRESENTACIÓN:

Envase con x comprimidos

CLASIFICACION TERAPEUTICA:

Agente betabloqueador selectivo ~~Antihipertensivo. Bloqueante beta-adrenérgico~~

INDICACIONES:

Tratamiento de la hipertensión arterial esencial, y de profilaxis de la angina de pecho y del infarto agudo al miocardio.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:**- Mayores de 60 años**

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo que debe seguir las indicaciones de su médico durante el tratamiento con atenolol. En pacientes que presentan algún tipo de daño renal puede ser necesario disminuir la dosis, consulte con su médico si presenta este tipo de complicaciones.

- Consumo de alcohol

Usted debe evitar el consumo de alcohol, mientras se encuentre en tratamiento con este medicamento, ya que se aumenta el riesgo de efectos adversos del alcohol y del medicamento.

- Manejo de vehículos

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y/o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a imprevistos. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

- Embarazo

Este medicamento puede causar daño al feto, usted debe discutir con su médico la conveniencia de usar este medicamento en el caso de estar embarazada.

- Lactancia

Este medicamento pasa a la leche materna y puede afectar al lactante. Converse con su médico la conveniencia de seguir el tratamiento o dejar de amamantar.

- Lactantes y niños

No se debe utilizar en niños, a menos que su pediatra así lo indique.

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE**ATENOLOL COMPRIMIDOS 50 mg****- Precauciones especiales**

Atenolol puede hacerle más sensible al frío, especialmente si tiene problemas circulatorios.

El atenolol es una sustancia prohibida en el deporte de competición y puede dar positivo en un control de dopaje.

Este medicamento puede enmascarar los síntomas de una hiperglicemia, hable de este tema con su médico si usted presenta diabetes y está en tratamiento.

CONTRAINDICACIONES:

Si padece de bloqueo cardíaco, bradicardia intensa o shock cardiogénico.

Si ha presentado síntomas de alergia a este u otro medicamento betabloqueador.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

Embarazo y lactancia: se deberá tener presente que el atenolol atraviesa la barrera placentaria.

Niños: insuficiencia cardíaca manifiesta, bradicardia sinusal.

INTERACCIONES:**- Medicamentos**

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: ampicilina, antiácidos, glibenclamida, ácido acetilsalicílico y otros antiinflamatorios, dipyridamol, neostigmina, quinidina, clonidina, aminofilina, teofilina, clorfenamina, insulina, reserpina y propranolol, medicamentos para tratar el asma como es el caso de salbutamol.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular o cualquier otra enfermedad crónica y severa.

En el caso particular de este medicamento, si padece de acidosis metabólica, asma u otras Enfermedades broncoespásticas, cardiopatía isquémica, depresión, diabetes (atenolol puede enmascarar síntomas de baja de glucosa), enfermedad de Raynaud, feocromocitoma, hipertiroidismo, insuficiencia cardíaca, miastenia gravis, soriasis.

- Exámenes de laboratorio

Se pueden ver afectados diversos resultados de exámenes sanguíneos y pruebas de diagnóstico, por lo que debe informar que está utilizando este medicamento antes de realizarse algún examen.

EFFECTOS ADVERSOS (no deseados):

Los más comunes son frialdad en las extremidades, fatiga muscular y, en casos aislados, bradicardia. En ocasiones se presentan trastornos del sueño, igual que con otros betabloqueantes. Existen posibilidades de bloqueo A-V, insuficiencia cardíaca, crisis asmáticas o hipoglucemia. En caso de erupciones cutáneas tipo psoriasis deberá suspenderse el tratamiento, por probable hipersensibilidad al fármaco.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN**VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral**

El médico debe indicar la posología y el tiempo apropiado de tratamiento en su caso en particular, no obstante la dosis usual es:

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

ATENOLOL COMPRIMIDOS 50 mg

Hipertensión: la mayoría de los pacientes responden a una dosis de 100 mg/día en una toma única; algunos pueden ser mantenidos con una dosis de 50 mg/día.

Angor pectoris: la dosis eficaz es de 100 mg en dosis única diaria ó en 2 tomas de 50 mg.

~~**Arritmias:** luego del tratamiento I.V. con atenolol puede indicarse una terapéutica de mantenimiento por vía oral con 50 mg a 100 mg/día.~~

En pacientes con *Insuficiencia Renal* deberá ajustarse la posología, dado que la eliminación de esta droga se produce por vía urinaria.

En los *Pacientes Ancianos* la reducción del metabolismo y de la capacidad de excreción puede aumentar la depresión miocárdica y requerir una disminución de la dosis.

- Consejo de cómo administrarlo

Debe tomarlo con el estómago vacío. Además debe evitar el consumo de alcohol y cafeína. No suspenda este medicamento sin previa consulta a su médico aunque se sienta mejor, puede que sea necesario ir disminuyendo la dosis que usted toma gradualmente.

Recuerde que la hipertensión generalmente es asintomática, pero puede traer muchas complicaciones si no se maneja adecuadamente.

- Uso prolongado

Este medicamento es usado durante periodos prolongados, pero debe usarlo bajo supervisión médica acudiendo a control en forma periódica.

SOBREDOSIFICACION

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: dificultad para respirar, disminución de los latidos cardíacos, presión arterial muy baja. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Mantener fuera del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no más de 30° C.

Reg. I.S.P. N°

No repita el tratamiento sin indicación médica

No recomiende este medicamento a otra persona.

No usar después de la fecha de vencimiento indicada en el envase