



LABORATORIOS ANDROMACO S.A.

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA
Departamento Control Nacional
Sección Registro

FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE
ATOMEX ATENOLOL COMPRIMIDOS 50 mg

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o **químico** farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su médico.

COMPOSICION:

Cada comprimido recubierto contiene:

Atenolol 50 mg

Excipientes c.s.

(Lactosa spray dried, celulosa microcristalina, almidón glicolato de sodio, dióxido de silicio coloidal, estearato de magnesio, colorante laca azul N°2 C.I. 73015)

DEPARTAMENTO CONTROL NACIONAL
N° Ref.: 15.122/05
SECCIÓN REGISTRO

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía oral

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA
Departamento Control Nacional

REGISTRO N°

F-15.201/05

CLASIFICACION:

Betabloqueador cardioselectivo – Antihipertensivo - Antianginoso

25 OCT 2005

INDICACION:

~~Tratamiento de la Hipertensión esencial, Angor pectoris, Arritmias cardíacas, coadyuvantes en el tratamiento de la estenosis subaortica hipertrofica.~~

Tratamiento de la hipertensión arterial. Profilaxis en crisis anginosa.

FOLLETO DE INFORMACIÓN
AL PACIENTE

ADVERTENCIAS:

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica, el cual evaluará los riesgos y beneficios de su uso.

Principalmente se deben considerar los aspectos siguientes:

- Alergias: Informe a su médico si alguna vez a presentado alguna reacción alérgica a este medicamento o alguna otra sustancia, ya sea alimentos, preservantes, colorantes, saborizantes u otros medicamentos.
- Embarazo: Informe a su médico si está embarazada o planea estarlo, ya que no se recomienda administrar este medicamento durante el embarazo.
- Lactancia: Consulte a su médico acerca de la conveniencia del uso de este medicamento mientras esté amamantando.



- Niños: No se recomienda su uso en niños.
- Ancianos: En sujetos de edad avanzada el medicamento se puede acumular, por lo que se debe ajustar la dosificación en estos pacientes.
- Daño renal: Se debe tener precaución al iniciar el tratamiento en pacientes con algún daño renal, en relación con la dosificación del producto, podría requerirse un eventual ajuste de la dosis.

CONTRAINDICACIONES:

~~Atome~~ **Atenolol** esta contraindicado en pacientes con bradicardia sinusal, en insuficiencia cardíaca, en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva controlada por digitálicos y diuréticos

INTERACCIONES:

El efecto de este medicamento puede modificarse por su administración junto con otros medicamentos (interacciones). Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta, como: Antihipertensivos, Diuréticos, Nifedipino, Amiodarona, Diltiazem, hidróxido de aluminio, neurolépticos, glucósidos digitálicos teofilina o aminofilina

PRESENCIA DE OTRAS ENFERMEDADES:

El efecto de este medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos.

Debe informarle a su médico si padece de alguna enfermedad, principalmente en los siguientes casos: asma o enfermedades de otro tipo al pulmón, diabetes, alergias severas, hipertiroidismo, feocromocitoma, insuficiencia cardíaca, frecuencia cardíaca lenta, problemas a la circulación o enfermedades al corazón o riñón.

EFFECTOS ADVERSOS: (No deseados)

El uso de este medicamento puede producir algunos efectos no deseados, además de los que se pretende obtener.

Las reacciones adversas generalmente son leves y transitorias, como: mareos, náuseas, cansancio, somnolencia, depresión, malestar estomacal

Algunas molestias pueden provocar graves consecuencias para la salud, algunos de ellos son: dificultad para respirar, inflamación de las extremidades, aumento de peso inusual, desmayos.

Si usted nota cualquier otro efecto molesto no mencionado consulte con el médico o farmacéutico.

FOLLETO DE INFORMACIÓN
AL PACIENTE



PRECAUCIONES:

Debe utilizarse con precaución en pacientes con antecedentes de alergia al medicamento o a algunos de sus componentes.

FORMA DE ADMINISTRACIÓN:

Use este medicamento siguiendo las instrucciones dadas por su médico, no use más ni en mayor frecuencia que la indicada.

DOSIS:

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendable es de 50 mg una vez al día,.

SOBREDOSIS:

En caso de intoxicación accidental por sobredosis de este medicamento, debe recurrir inmediatamente a un centro hospitalario.

Tratamiento:

El tratamiento de la sobredosis debe ser sintomático y de soporte.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Mantener fuera del alcance de los niños.

Guardar en su envase original, protegido del calor, la luz y la humedad.

No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin indicación médica.

No recomiende este medicamento a otra persona.

FOLLETO DE INFORMACIÓN
AL PACIENTE



BIBLIOGRAFIA:

1. DEF. Diccionario de especialidades farmacéuticas. Atenolol
Versión electrónica. 49ª edición, México, 2003.
2. Martindale
The complete drug reference,
USA, 32 Ed. 1999. pág. 825 – 826.
3. PDR
Physician's Desk Reference
Medical Economics Company, USA, 53 Ed. 1999, pp:3438 – 3441.
4. Vidal
Le Dictionnaire VIDAL
Edition Du Vidal, Paris, Francia, 76 Ed. 2000, pp:2000 - 2001.
5. Medline Plus Drug Information. Atenolol.
<http://www.nlm.nih.gov>
6. <http://www.vademecum.medicom.es>
7. <http://www.rxlist.cl>
8. <http://www.drugs.com>

