



LABORATORIO BENGUEREL LTDA.

AV. VICUÑA MACKENNA 3451 - FONO: 5556001 - CASILLA 1520 - CABLES: "ANDROMACO" - TELEX: 240845 - ANORO CL
FAX: (562) 5554105 - SANTIAGO-CHILE

5/7/93

FOLLETO PARA INFORMACION MEDICA

OXOLAMINA

FOLLETO PARA INFORMACION MEDICA
EXCLUSIVAMENTE NO INCLUIRLO EN
EL ENVASE DE VENTA AL PUBLICO.-

DESCRIPCION:

La Oxolamina, derivado sintético dietilaminoetilico del 1, 2, 4 - oxadiazol, representa el único agente antiinflamatorio no esterooidal que carece no sólo de función acídica, sino más bien es de carácter básico por su agrupación aminica terciaria y carece de acciones gastrolesivas.

Actúa fundamentalmente sobre la inflamación aguda del tracto respiratorio y ejerce una acción antitusígena complementaria.

Como antiinflamatorio actúa sobre la mucosa de las vías respiratorias destruyendo la neuraminidasa determinante de la inflamación.

La Oxolamina ha demostrado reducir el proceso flogístico local. Eleva el umbral doloroso de los tejidos inflamados, no así de los tejidos sanos.

Como antitusígeno, a diferencia de otros antitusivos, inhibe el reflejo tusígeno en su nacimiento, a través de las fibras receptoras, sin influencia sobre los centros cerebrales superiores y sin causar depresión central.

Conjuntamente con su actividad secretolítica, fluidifica la expectoración mejorando las molestias de la tos y las características del esputo.

INDICACIONES Y USO CLINICO:

En todos los procesos que se acompañan de tos, especialmente los que cursan con inflamación del árbol bronquial, tales como laringitis, reacciones laringeas post-operatorias, traqueo-bronquitis, bronconeumonía, neumopatías febriles, asma, tos por aspiración de sustancias irritativas y en general en procesos inflamatorios agudos y crónicos de las vías respiratorias.



LABORATORIO BENGUEREL LTDA.

AV. VICUÑA MACKENNA 3451 - FONO: 5556001 - CASILLA 1520 - CABLES: "ANDROMACO" - TELEX: 240845 - ANDRO CL
FAX: (562) 5554105 - SANTIAGO-CHILE

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS:

Hipersensibilidad al fármaco.

Advertencia: No administrar a niños menores de 3 meses.

FOLLETO PARA INFORMACION MEDICA
EXCLUSIVAMENTE NO INCLUIRLO EN
EL ENVASE DE VENTA AL PUBLICO.-

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:

Oxolamina puede utilizarse concomitantemente con antibióticos sistémicos, de acuerdo con criterio médico y si el cuadro clínico lo requiere.

El fármaco interactúa con anticoagulantes orales, prolongando el tiempo de protrombina.

PRECAUCIONES EN EL USO:

Usese con precaución en pacientes que usen anticoagulantes orales, en los cuales debe controlarse el tiempo de protrombina.

Embarazo y lactancia:

No se han realizado estudios controlados en embarazadas.

Su administración durante el embarazo y la lactancia debe valorar las ventajas contra el posible riesgo sobre el feto y el lactante.

REACCIONES ADVERSAS:

Ocasionalmente en algunos pacientes sensibles pueden presentarse algunos efectos gastrointestinales, como náuseas y vómitos, que disminuyen cuando el preparado oral se administra con las comidas.

En raras ocasiones se ha reportado casos de somnolencia, sequedad de la boca, palpitaciones y mareos.

En niños, ^{se ha informado} excitación, agitación y alucinaciones ~~por sobredosis~~.



LABORATORIO BENGUEREL LTDA.

AV. VICUÑA MACKENNA 3451 - FONOS: 5566001 - CASILLA 1520 - CABLES: "ANDROMACO" - TELEX: 240645 - ANDRO CL
FAX: (562) 5554105 - SANTIAGO-CHILE

VIA DE ADMINISTRACION Y DOSIFICACION (Posología):

Vía oral y rectal.

Para adultos y niños mayores de 12 años, la dosis usual es de 1-2 cucharaditas de 5 ml de jarabe adultos, cada 4 horas.

Para niños de 2-11 años, 2 cucharaditas de 5 ml del jarabe pediátrico cada 4 horas, o bien 1 supositorio 2-3 veces al día.

Para niños menores de 2 años y lactantes de más de 3 meses, puede emplearse 1 cucharadita de 5 ml de jarabe pediátrico 2-3 veces al día, o bien 1 supositorio 2 veces al día.

La duración óptima del tratamiento requiere de unos 6-8 días.

FORMULA:

5 ml de jarabe de adulto contienen:

Oxolamina (como fosfato) 50 mg

5 ml de jarabe infantil contienen:

Oxolamina (como citrato) 28 mg

Cada supositorio infantil contiene:

Oxolamina (como citrato) 140 mg

PRESENTACION:

Frasco con 100, 120, 160 y 200 ml de jarabe adulto.

Frasco con 50, 60, 100, 120 y 160 ml de jarabe infantil.

Envases con 5, 6, 10 y 12 supositorios infantiles.

FOLLETO PARA INFORMACION MEDICA
EXCLUSIVAMENTE NO INCLUIRLO EN
EL ENVASE DE VENTA AL PUBLICO.-