

FOLLETO DE INFORMACION MEDICA

METAMIZOL SODICO 250 mg

Supositorio

LABORATORIO PASTEUR

COMPOSICION

Cada supositorio contiene:
Metamizol sódico 250 mg

Instituto de Salud Pública
Departamento de Control Nacional
Sección Registro de Especialidades Farmacéuticas

INDICACIONES

Tratamiento sintomático de ^{dolor en} ~~manejos~~ ^{manejos} afecciones caracterizadas por dolor agudo, fiebre, Gripe, ~~pneumonia y otras enfermedades infecciosas.~~ Alivio general de dolores agudos, ~~micróticos~~ dolor de cabeza, ciática, neuralgia. ~~Después de la extracción~~ en odontalgia, dolor postoperatorio y en ~~puñes~~ los procedimientos dentales que requieran analgesia.

PRECAUCIONES

Debe usarse con precaución en pacientes con ^{mieloides} ~~una~~ ^{verruca} ~~de~~ leucocitos más bajo de lo normal; insuficiencia hepática, discracias sanguíneas. ~~Cuando se use por periodos prolongados, conviene realizar exámenes hematológicos.~~

CONTRAINDICACIONES

Antecedentes de intolerancia o reacción a la antipiririna, aminopirina o dipirona; enfermedad hepática.

ADVERTENCIA

Se ha observado granulocitopenia marcada en pacientes sensibles a derivados de la pirazolona.

POSOLOGIA

En caso de ser necesario administrar a niños (temperatura rectal superior a 38,5° y axilar superior a 39°) entre 5 a 14 años tres a cuatro veces al día.

PRESENTACION

Caja de 5 supositorios para niños.

FOLLETO PARA INFORMACION
MEDICA EXCLUSIVAMENTE NO
INCLUIRLO EN EL ENVASE DE
VENTA AL PUBLICO.-

MD
1-10-91

FOLLETO DE INFORMACION AL PUBLICO

METAMIZOL SODICO 250 mg

Supositorios

LABORATORIO PASTEUR

Instituto de Salud Pública
Departamento de Control Nacional
Sección Registro de Especialidades Farmacéuticas

Indicaciones : Para el tratamiento sintomático de estados dolorosos y febriles, dolor de cabeza, de dientes, dolores musculares, alivio del malestar que acompaña al resfrío, reumatismo lumbago.

Modo de uso y dosis: Sacar el supositorio de su envase y colocar por vía rectal.

Dosis usual salvo indicación médica:

Niños 6 a 12 años : 1 supositorio 3 a 4 veces al día.

Niños 4 a 5 años : 1 supositorio 2 a 3 veces al día.

Efectos adversos: Reacciones alérgicas a la piel (manchas, zarpullidos), Molestias digestivas (dolor estomacal, náuseas, vómitos).

Contraindicaciones: Este medicamento no debe administrarse a personas alérgicas a compuestos que contengan Metamizol Sódico.

Precauciones : Debe administrarse con precaución a personas con antecedentes de enfermedades del hígado o riñones. En mujeres embarazadas o que amamantan, debe administrarse sólo por indicación médica.

Advertencia : En tratamientos prolongados, su administración debe ser controlada por el médico.

PROSPECTO INTERNO
PARA INCLUIR EN EL ENVASE
DE VENTA AL PUBLICO

MARS

MD
1-10-91