

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

IBUPROFENO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 mg

**FOLLETO DE INFORMACION AL
PACIENTE****Ibuprofeno****Comprimidos recubiertos 200 mg****FOLLETO DE INFORMACIÓN
AL PACIENTE****IBUPROFENO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 mg****Condición de venta:**

Venta Directa en Establecimientos tipo A y B

Clasificación:

Analgésico, Antiinflamatorio, Antipirético

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE	
AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS	
SUBDEPTO. REGISTRO Y AUTORIZACIONES SANITARIAS	
OFICINA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SIMILARES	
26 SET. 2013	
N° Ref:	RF483152/13
N° Registro:	F-20.393/13
Firma Profesional:	VSV

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

Composición y presentación:**Principio activo:** Ibuprofeno 200 mg**Excipientes:** Lactosa monohidrato, Almidón de maíz, Hipromelosa 2910, ~~Silica coloidal anhidra~~ **Dióxido de silicio coloidal**, Celulosa microcristalina, Croscarmelosa sódica, ~~Acido esteárico vegetal~~ **Estearato de magnesio**, Macrogol 400, Macrogol 6000, Dióxido de titanio, c.s.

Disponible en envases conteniendo X comprimidos recubiertos.

1.- ¿Para qué se usa?

Para el alivio de procesos inflamatorios y dolorosos de tejidos blandos y músculo esqueléticos y para reducir la temperatura en cuadros febriles.

~~Tratamiento sintomático de estados inflamatorios dolorosos, de leves a moderados y/o estados febriles.~~

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

IBUPROFENO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 mg

~~Tratamiento de la dismenorrea primaria.~~

~~Alivio de los síntomas y signos de la artritis reumatoidea y osteoartritis.~~

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es: 200 a 800 mg. 3 a 4 veces al día.

La dosis máxima diaria no debe pasar los 3200 mg.

- Consejo de cómo administrarlo

Puede tomarlo en conjunto con alimentos, leche o antiácidos para evitar malestar estomacal.

- Uso prolongado

El uso prolongado de este medicamento puede causar problemas estomacales (úlceras), inflamación del hígado, problemas a los riñones y hemorragias. No se recomienda tomarlo, sin vigilancia médica, más de 7 días para el tratamiento del dolor o más de 3 días si lo ha estado tomando para el control de la fiebre.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

Los problemas estomacales pueden ser severos en pacientes mayores de 60 años.

- Consumo de alcohol

Si se toma junto al medicamento puede aumentar el riesgo de problemas estomacales y hemorragias.

- Manejo de vehículos

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a imprevistos. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

- Embarazo

Este medicamento puede causar daño al feto, usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.

No utilice ibuprofeno en los tres últimos meses de embarazo.

- Lactancia

Debe consultar al médico antes de usar este medicamento si está amamantando.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN
AL PACIENTE**

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

IBUPROFENO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 mg

- Lactantes y niños

Lo puede utilizar sólo si está indicado por su pediatra y bajo circunstancias específicas.

- Precauciones especiales

Este tipo de medicamentos interfiere en la coagulación de la sangre, por lo que se recomienda dejar de tomarlo por lo menos tres días antes de someterse algún tipo de cirugía.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si tiene úlcera gastroduodenal.

Si ha presentado síntomas de alergia al ibuprofeno o a medicamentos similares como el ácido acetilsalicílico (aspirina).

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

Estando embarazada o durante el periodo de lactancia.

No debe usar este medicamento **con excepción del ácido acetilsalicílico** en el periodo inmediato a un by pass coronario

5.- Advertencias:

Usted debe consultar a su médico antes de usar este medicamento si tiene o ha tenido alguna enfermedad al corazón (como angina de pecho, infarto agudo al miocardio, insuficiencia cardíaca)

Debe comunicar a su médico si sufre o ha sufrido problemas de sangramiento gastrointestinal o úlceras estomacales.

6.- Contraindicaciones:

No se debe usar AINES con excepción de Acido Acetilsalicílico en el periodo inmediato a una cirugía de by-pass coronario.

7.- Interacciones**- Medicamentos**

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: medicamentos para la presión, prednisona, warfarina, antibióticos en general, Itraconazol o Ketoconazol, Penicilamina, Acido Valpróico, Fenitoína, Ciclosporina, Digoxina o Digitoxina, Litio, Metotrexato, Probenecid, Triamtireno o Zidovudina (AZT). No se debe tomar en forma conjunta con otros medicamentos como ácido acetilsalicílico (aspirina) (o similares) a menos que su médico así lo determine.

- Enfermedades

FOLLETO DE INFORMACIÓN
AL PACIENTE

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

IBUPROFENO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 mg

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular o cualquier otra enfermedad crónica y severa.

En el caso particular de este medicamento, si padece de hemorragias, inflamación o úlceras en el estómago e intestinos, hipertensión arterial, diabetes mellitus, lupus eritematoso sistémico, anemia, asma, epilepsia, enfermedad de Parkinson, cálculos renales, o historia de enfermedades al corazón o consumo crónico de alcohol, enfermedades renales o al hígado.

8.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: dificultad para respirar, con o sin adormecimiento de las pierna, dolor en el pecho, úlcera péptica con vómitos con sangre, melena, disminución de la frecuencia para orinar o en la cantidad de orina.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: náuseas, diarrea leve, constipación leve, dolor de cabeza leve, vértigo, somnolencia, úlceras o dolor en la boca, inusuales temblores o entumecimiento de las manos o los pies.

9.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: náuseas, vómitos, dolor de cabeza severo, confusión y mal estar.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

10.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.

FOLLETO DE INFORMACIÓN
AL PACIENTE