



FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE CICLOBENZAPRINA CLORHIDRATO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 10 mg



Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su Médico o Químico Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponde exactamente al indicado por su Médico.

Composición:

Cada comprimido recubierto contiene:

Ciclobenzaprina Clorhidrato 10 mg

Excipientes: Croscarmelosa Sódica, Lauril Sulfato de Sodio, Dióxido de Silicio Coloidal, Povidona K-30, Lactosa Monohidrato, Estearato de Magnesio, Celulosa Microcristalina, Dióxido de Titanio, Macrogol 3000, Talco, Alcohol Polivinílico Parcialmente Hidrolizado.

Clasificación:

Relajante muscular

Indicación:

Alivio de espasmos musculares asociados a condiciones agudas dolorosas musculoesqueléticas.

Advertencias y Precauciones:

- No usar en niños menores de 15 años, sin indicación médica.
- Usar con precaución en pacientes con antecedentes de retención urinaria, glaucoma de ángulo cerrado, aumento de la presión intraocular o en pacientes que reciben drogas anticolinérgicas porque posee efectos adversos anticolinérgicos.
- Puede afectar la capacidad para ejecutar actividades peligrosas que requieran alerta mental o coordinación física, tales como conducir un automóvil u operar instrumentos o maquinaria.
- En embarazo y lactancia debe usarse sólo si los beneficios terapéuticos justifican los riesgos potenciales para el feto.
- Este medicamento contiene lactosa, precaución en pacientes con intolerancia a la lactosa.

Contraindicaciones:

Si su Médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no debe usar este medicamento en las siguientes condiciones:

- En pacientes con alergia a Ciclobenzaprina Clorhidrato.

- Pacientes con hipertiroidismo, falla cardíaca congestiva, arritmias, desórdenes del bloqueo y conducción cardíaca y en la recuperación de la fase aguda de un infarto al miocardio.
- Pacientes que reciben inhibidores de la monoaminoxidasa y no debiera ser usada dentro de los 14 días siguientes de discontinuarse la terapia.

Interacciones:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (interacciones). Ud. debe comunicar a su Médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta médica, antes de usar este fármaco.

- Alcohol, depresores del Sistema Nervioso Central, antidepresivos tricíclicos. Pueden aumentar la posibilidad de efectos adversos.

- Inhibidores de Monoaminoxidasa. Tomando Ciclobenzaprina mientras se está tomando o se dejó de tomar hace menos de 2 semanas los inhibidores de la Monoaminoxidasa puede aumentar la posibilidad de efectos adversos.

Efectos Adversos (no deseados):

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Algunos de estos efectos pueden requerir atención médica.

Los más comunes son somnolencia, sequedad bucal y mareos. Menos frecuentes: torpeza o temblor, confusión, depresión mental u otros cambios de humor o mentales, problemas al orinar, timbre o zumbido de oídos, rash, urticaria o picazón en la piel sin que ocurran los otros síntomas de reacciones alérgicas, inusuales pensamientos o sueños, ojos o piel amarillos, dolor de cabeza, fatiga o cansancio, dispepsia, constipación, gusto desagradable, visión borrosa, nerviosismo, taquicardia, hipotensión, palpitaciones, arritmias, ansiedad, vómitos, diarrea, dolor gastrointestinal, gastritis, flatulencia, sed, transpiración.

Forma de Administración:

Via oral.

Dosis:

El Médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular. No obstante, la dosis usual recomendada en adultos es 10 mg tres veces al día, con un rango de 20 a 40 mg diarios en dosis divididas. La dosis máxima es de 60 mg diarios. El período de tratamiento no puede ser superior a 2-3 semanas.

Sobredosis:

En casos de ingestión accidental se pueden presentar los siguientes síntomas: convulsiones, mareos (severos), piel sonrojada, seca y calurosa, latidos cardíacos rápidos e irregulares, alucinaciones (ver, oír y sentir cosas que no son), aumento o disminución de la temperatura corporal, problemas al respirar, rigidez muscular inexplicable. Inusual nerviosismo o inquietud (severa) y vómito.

Conduzca al intoxicado a un Centro de Atención Médico Hospitalario.

Condiciones de Almacenamiento

Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no más de 30 °C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA**

V4
731077
08.08.18