

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

LOSARTÁN POTÁSICO/HIDROCLOROTIAZIDA 50/12,5
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS~~Losartán Potásico/Hidroclorotiazida 50/12,5~~~~Losartan potásico 50 mg +~~~~Hidroclorotiazida 12,5 mg~~

Comprimidos recubiertos

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE
AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS
SUSPENSIÓN, REGISTRO Y AUTORIZACIONES SANITARIAS
FARMACÉUTICOS SIMILARES

19 NOV. 2012

N° Ref: RF 361478/12

N° Registro: F-19663/12

Firma Profesional: [Firma]

~~LOSARTAN POTÁSICO 50 mg/HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 mg COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS~~

Condición de venta: Venta bajo receta médica en establecimientos tipo A

Clasificación: Antagonista de la Angiotensina II y Diurético
~~antihipertensivo, diurético~~

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o al químico-farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

Composición y presentación:

Principios Activos: Losartán potásico 50,0 mg
Hidroclorotiazida 12,5 mgExcipientes: Celulosa microcristalina, croscarmelosa de sodio ~~sódica~~, dióxido de silicio coloidal, talco, estearato de magnesio, macrogol 400, hipromelosa 2910, dióxido de titanio, polisorbato 80.

Disponible en envases conteniendo X comprimidos recubiertos.

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento está indicado para reducir la presión arterial elevada.Tratamiento de la hipertensión arterial en los pacientes en que sea apropiado el tratamiento combinado. Reducción del riesgo de accidenteFOLLETO DE INFORMACIÓN
AL PACIENTE

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE**LOSARTÁN POTÁSICO/HIDROCLOROTIAZIDA 50/12,5
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS**

cerebro-vascular en pacientes con hipertensión e hipertrofia ventricular izquierda.

2.- Administración (oral)

Tome este medicamento todos los días, tal como se lo ha indicado su doctor. Es importante continuar su tratamiento con este medicamento por el tiempo que su doctor lo indique, para mantener un control adecuado de su presión arterial.

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

Reducción del riesgo de accidentes cerebrovasculares en pacientes con hipertensión e hipertrofia ventricular izquierda:

La dosis usual es de 50 mg de losartán una vez al día. Si la meta de presión sanguínea deseada no se alcanza, la terapia debe ser titulada usando combinación de losartán y una dosis baja de hidroclorotiazida (12,5 mg) y si es necesario, la dosis debe luego ser aumentada a 100 mg de losartán y 12,5 mg de hidroclorotiazida una vez al día. Si es necesario, la dosis debe ser aumentada a 100 mg de losartán y 25 mg de hidroclorotiazida una vez al día.

- Personas de edad avanzada

En general este medicamento funciona bien y es igualmente bien tolerado por la mayoría de los ancianos y pacientes adultos jóvenes. Pacientes mayores requieren la misma dosis que pacientes más jóvenes.

- Embarazo

No se recomienda el uso de este medicamento durante el embarazo ni durante la lactancia.

- Niños

No hay experiencia con el uso de este medicamento en niños. Por lo tanto no debe ser administrado en niños.

- Precauciones especiales

Se recomienda no realizar tareas que requieran atención especial (por ejemplo, el manejar un automóvil u operar maquinaria pesada) hasta que usted no sepa cómo ha tolerado este medicamento.

3.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a Losartán potásico e Hidroclorotiazida o a cualquier derivado de las sulfonamidas.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

Si no está orinando.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN
AL PACIENTE**

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE**LOSARTÁN POTÁSICO/HIDROCLOROTIAZIDA 50/12,5
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS****4.- Interacciones****- Medicamentos**

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. Es particularmente importante para su médico saber si usted está tomando suplementos de potasio, sustancias retenedoras de potasio o sustitutos de sal que contengan potasio, otros medicamentos para tratar la diabetes, incluyendo insulina, relajantes musculares, aminas presoras tales como adrenalina, esteroides, ciertos medicamentos para el dolor y artritis, o litio. Los sedantes, tranquilizantes, los narcóticos, el alcohol y los analgésicos pueden aumentar el efecto hipotensor de este medicamento, así que infórmele a su médico si usted está tomando cualquiera de estos medicamentos.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular o cualquier otra enfermedad crónica y severa.

5.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: mareos

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento: diarrea, dispepsia, mareo, insomnio.

6.- Sobredosis

En caso de sobredosis, llame a su doctor inmediatamente para que se le brinde atención médica rápidamente.

7.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener **fuera** **lejos** del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los **25°C 30°C**.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN
AL PACIENTE**