



ACETAZOLAMIDA COMPRIMIDOS 250 MG

COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN:

Cada comprimido contiene: Acetazolamida 250 mg.

Excipientes: Almidón de Maíz, Celulosa Microcristalina, Croscarmelosa Sódica, Behenato de Glicerilo, Dióxido de Silicio Coloidal, Estearato de Magnesio, Gelatina, Lauril Sulfato de Sodio, Lactosa Monohidrato.

CLASIFICACIÓN:

Antiglaucomatoso y diurético.

INDICACIÓN:

Glaucoma de ángulo abierto, glaucoma secundario. Manejo de edemas secundarios a enfermedad cardíaca, congestiva o terapias con fármacos. Epilepsias tipo ausencias (Petit-Mal), prevención del mal de alturas.

FORMA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía oral, se recomienda administrar con comida.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

ÚSESE SÓLO POR INDICACIÓN Y BAJO SUPERVISIÓN MÉDICA.

Acetazolamida puede aumentar la frecuencia o la cantidad de orina, al continuar el tratamiento este efecto disminuye o desaparece. Acetazolamida puede afectar su capacidad para realizar actividades que requieran de alerta mental o coordinación física. Este medicamento puede causar una pérdida de potasio del organismo, por lo que su médico le puede recomendar una dieta con alimentos ricos en potasio o un suplemento de potasio.

CONTRAINDICACIONES:

No usar este medicamento en los siguientes casos:

- Embarazo, lactancia.
- Alergia a Acetazolamida, sulfonamidas, diuréticos tiazidicos o alguno de los componentes de la formulación.

INTERACCIONES:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros fármacos o alimentos, por lo que Ud. debe informar a su médico si está tomando otros medicamentos, ya sea con o sin receta médica, antes de usar este fármaco, especialmente si se trata de otros diuréticos, litio, quinidina, anfetaminas, fenobarbital, salicilatos, hipoglicemiantes orales, glicósidos cardíacos, corticoesteroides, primidona, ciclosporina y algunas vitaminas. No olvide mencionar que Ud. está tomando este medicamento, en caso de requerir atención médica por otras razones, o en caso de que se someta a algún examen.

EFFECTOS ADVERSOS:

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Consulte inmediatamente al médico si alguno de estos síntomas ocurre: Problemas para respirar, debilidad o cansancio inusuales, sangre, dolor o dificultad al orinar, convulsiones, fiebre, rash cutáneo, debilidad muscular severa, sequedad de la boca, latido cardíaco irregular, cambios en la visión.



ACETAZOLAMIDA COMPRIMIDOS 250 MG

DOSIS:

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular, no obstante, la dosis usual recomendada es: Para diuresis por falla cardíaca se usa en dosis de 250 a 375 mg 1 vez al día en la mañana. Para edema producido por medicamentos la dosis recomendada es 250 a 375 mg 1 vez al día durante 1 ó 2 días alternando con un día de descanso. Tratamiento de glaucoma un rango entre 250 a 500 mg, repartidos en 1 a 4 tomas diarias. Anticonvulsivante un rango entre 8 a 30 mg/kg de peso repartidas en 1 a 4 tomas diarias. Tratamiento del mal de montaña una dosis de 250 mg cada 6 a 12 horas. Para el mal de montaña la dosis recomendada es 500 a 1000 mg diarios en dosis separadas, usando comprimidos o cápsulas de liberación prolongada, según sea adecuado; es preferible iniciar la dosificación 24 a 48 horas antes del ascenso y continuarlo durante 48 horas posterior al ascenso o más según sea necesario para controlar los malestares.

SOBREDOSIS:

En caso de ingestión involuntaria conduzca inmediatamente al intoxicado a un centro de atención médico.