




FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE ACETAZOLAMIDA COMPRIMIDOS 250 mg



Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su Médico o Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponde exactamente al indicado por su Médico.

Composición:

Cada comprimido contiene:

Acetazolamida 250 mg

Excipientes: Almidón de Maíz, Celulosa Microcristalina, Croscarmelosa Sódica, Behenato de Glicerilo, Dioxido de Silicio Coloidal, Estearato de Magnesio, Gelatina, Lauril Sulfato de Sodio, Lactosa Monohidrato.

Indicación:

Glaucoma de ángulo abierto, glaucoma secundario. Manejo de edemas secundarios a enfermedad cardíaca congestiva o terapias con fármacos. Epilepsias tipo ausencias (Petit-Mal), prevención del mal de alturas.

Clasificación:

Antiglaucomatoso y diurético

Advertencias y Precauciones:

Usese sólo por indicación y bajo supervisión médica

- Acetazolamida puede aumentar la frecuencia o la cantidad de orina, al continuar el tratamiento este efecto disminuye o desaparece.
- Acetazolamida puede afectar su capacidad para realizar actividades que requieran de alerta mental o coordinación física.
- Este medicamento puede causar una pérdida de potasio del organismo, por lo que su Médico le puede recomendar una dieta con alimentos ricos en potasio o un suplemento de potasio.
- Los pacientes que toman Acetazolamida como anticonvulsivante deben suspender el tratamiento en forma gradual.

Contraindicaciones:

Si su Médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

- Embarazo, lactancia.
- Alergia a Acetazolamida, sulfonamidas, diuréticos tiazídicos o alguno de los componentes de la formulación.

Interacciones:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros fármacos o alimentos, por lo que Ud. debe informar a su Médico si está tomando otros medicamentos ya sea con o sin receta médica antes de

usar este fármaco, especialmente si se trata de otros diuréticos, Litio, Quinidina, anfetaminas, Fenobarbital, salicilatos, hipoglucemiantes orales, glicósidos cardíacos, corticosteroides, primidona, cidosporina y algunas vitaminas. No olvide mencionar que Ud. está tomando este medicamento, en caso de requerir atención médica por otras razones, o en caso que se someta a algún examen.

Presencia de otras enfermedades:

El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos. En caso de sufrir alguna enfermedad usted debe consultar a Médico o Farmacéutico antes de ingerir este medicamento, especialmente en los casos siguientes: Diabetes Mellitus, enfisema u otra enfermedad pulmonar severa, gota, bajos niveles de sodio o potasio, enfermedad renal, cálculos renales, enfermedad hepática, insuficiencia de la glándula suprarrenal.

Efectos Adversos: (no deseados)

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Consulte inmediatamente al Médico si alguno de estos síntomas ocurre: problemas para respirar, debilidad o cansancio inusuales, sangre, dolor o dificultad al orinar, convulsiones, fiebre, rash cutáneo, debilidad muscular severa, sequedad de la boca, latido cardíaco irregular, cambios en la visión. Otros efectos son temporales y no requieren atención médica, salvo que estos sean muy molestos o se prolonguen en el tiempo: diarrea, aumento de la frecuencia o cantidad de orina, pérdida del apetito, gusto metálico en la boca, náuseas o vómitos, dolor de cabeza, somnolencia, nerviosismo o irritabilidad, convulsiones.

Forma de administración:

Via oral. Se recomienda administrar con comida.

Dosis:

El Médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

- Para diuresis por falla cardíaca se usa en dosis de 250 a 375 mg una vez al día en la mañana.
- Para edema producido por medicamentos la dosis recomendada es 250 a 375 mg una vez al día durante 1 ó 2 días alternando con un día de descanso.
- Tratamiento de glaucoma un rango entre 250 a 500 mg, repartidos en 1 a 4 tomas diarias.
- Anticonvulsivante un rango entre 8 a 30 mg/kg de peso repartidos en 1 a 4 tomas diarias.
- Tratamiento del mal de montaña una dosis de 250 mg cada 6 a 12 horas.
- Para el mal de montaña la dosis recomendada es 500 a 1000 mg diarios en dosis separadas, usando comprimidos o cápsulas de liberación prolongada, según sea adecuado, es preferible iniciar la dosificación 24 a 48 horas antes del ascenso y continuarlo durante 48 horas posterior al ascenso o más según sea necesario para controlar los malestares.

Sobredosis:

En caso de ingestión involuntaria conduzca inmediatamente al intoxicado a un Centro de Atención Médico.

Condiciones de Almacenamiento:

Manténgase fuera del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no más de 25 °C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA**

V2
730352
22.04.14

