

ARTWORK INFOLEAFLET

FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE

TOLBUTAMIDA 500 mg Comprimidos

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su médico.

COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN:

Cada Comprimido contiene:
Tolbutamida 500 mg.
Excipientes: Almidón de maíz, Povidona, Talco, Estearato de magnesio, Almidón glicolato sódico y Celulosa microcristalina

Envase con 1 a 2000 comprimidos.

INDICACIÓN:

Tratamiento de Diabetes mellitus no dependiente de insulina.

CLASIFICACIÓN:

Hipoglicemiante oral.

ADVERTENCIAS:

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica Los edulcorantes sintéticos no son adecuados para compensar la hipoglucemia. Informar al médico tan pronto como sea posible de cualquier episodio hipoglucémico y cualquier enfermedad nueva que aparezca durante el tratamiento con Tolbutamida. El paciente debe siempre informar su condición de diabético.

CONTRAINDICACIONES:

No usar en: Sensibilidad a los hipoglucemiantes orales, a las sulfamidas o a los diuréticos tiazídicos, acidosis importante, quemaduras o infecciones graves, coma diabético, cetoacidosis o cetosis importante, cirugía mayor, traumatismo grave. Embarazo.

INTERACCIONES:

Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta.

EFFECTOS INDESEABLES:

El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos que normalmente no requieren atención médica: Cambios en el sentido del gusto, estreñimiento o diarrea, mareos, somnolencia leve, dolor de cabeza, pirosis, aumento o disminución del apetito, náuseas, vómitos, dolor, sensación de plenitud o malestar en el estómago.

PRECAUCIONES:

Lactancia. Pacientes geriátricos y con insuficiencia renal. Pacientes con insuficiencia adrenal o hipofisaria sin tratar. fiebre elevada, náuseas y vómitos prolongados, disfunción tiroidea, estado físico debilitado, disfunción hepática, mal nutrición, disfunción renal. Este producto contiene almidón, precaución en pacientes celíacos.

DOSIS:

La que su médico indique.

Sin embargo, la dosis habitual es:

Dosis adultos:

Oral, inicialmente de 500 mg a 2 g al día, en varias tomas, ajustando gradualmente la dosificación hasta conseguir el control de la diabetes. Generalmente, las dosis de mantenimiento oscilan de 250 mg a 2 g diarios.

Nota: Se administran dosis fraccionadas, generalmente antes del desayuno y de la cena, para mejorar la tolerancia gastrointestinal y el control de la hiperglucemia en algunos pacientes. Los pacientes con problemas médicos que les hagan más sensibles a los efectos de la Tolbutamida pueden necesitar una dosis inicial menor.

Límites de prescripción en adultos:

Oral, hasta 3 g diarios.

Dosis geriátrica:

Puede ser necesaria una dosis inicial menor.

Nota: Los pacientes con problemas médicos que les hagan más sensibles a los efectos de la Tolbutamida pueden necesitar una dosis inicial menor.

MODO DE EMPLEO:

Administración Oral.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Mantener lejos del alcance de los niños. Almacenar a no más de 25 °C. Mantener en su envase, luz y la humedad, No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN INDICACIÓN MÉDICA. NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA.



bph2016-01

Size 148 mm x 200 mm

Cutter Guide

Guide of Pleated

Unvarnished area (internal)

BLACK