



FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE LORATADINA



Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su Médico o Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponde exactamente al indicado por su Médico.

Composición:

Loratadina Jarabe 5 mg/5mL

Cada 5mL (una cucharadita) de jarabe contiene:

Loratadina 5 mg

Excipientes: Benzoato de Sodio, Sacarina Sódica Dihidrato, Sacarosa, Ácido Citrico Anhidro, Propilenglicol, Polividona, Esencia de Cereza líquida, Agua Purificada.

Clasificación:

Antihistamínico (Antialérgico).

Indicación:

Indicado en la terapia paliativa de los síntomas producidos por rinitis alérgica estacional.

También está indicada en el manejo del prurito, eritema y urticaria asociada a urticaria idiopática crónica.

Advertencias y Precauciones:

Antes de usar este medicamento debe sopesarse los riesgos y los beneficios en su uso, los que deben ser discutidos entre Ud. y su Médico. Principalmente debe considerar los aspectos siguientes:

- **Alergias.** Ud. debe comunicar a su Médico si alguna vez ha presentado una reacción alérgica a este medicamento o alguna otra sustancia, ya sea alimentos, preservantes, colorantes, saborizantes u otros medicamentos.
- **Embarazo.** Ud. debe comunicar a su Médico si está embarazada o planea estarlo, ya que no se recomienda su uso en embarazadas.
- **Lactancia.** Ud. debe conversar con el Médico acerca de la conveniencia del uso de este producto mientras esté amamantando. Este medicamento pasa a la leche materna por lo que no se recomienda su administración en mujeres que estén amamantando.
- **No utilizar** en niños menores de 2 años.
- Se recomienda precaución al conducir vehículos u operar maquinaria.
- Se recomienda precaución si este medicamento se administra a ancianos, ya que éstos son usualmente más sensibles al efecto de los antihistamínicos.
- Ud. debe comunicar a su Médico si presenta insuficiencia hepática o renal.
- Loratadina Jarabe contiene Sacarosa, precaución en pacientes diabéticos.

- El tratamiento debe suspenderse 48 horas antes de iniciar cualquier tipo de prueba cutánea.
- Se recomienda tomar este medicamento preferentemente en la mañana luego del desayuno.

Interacciones:

El efecto de este medicamento puede modificarse por su administración junto a otros (interacciones). Ud. debe comunicar a su Médico o farmacéutico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta médica, antes de usar este fármaco. Administración conjunta con Ketoconazol, Eritromicina o Cimetidina puede aumentar la concentración plasmática de Loratadina. Ud. no debe ingerir Alcohol mientras toma este medicamento. No olvide mencionar que Ud. está tomando este medicamento en caso de requerir atención médica por otras razones, o en caso que se someta a algún examen.

Efectos Adversos (no deseados):

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Consulte inmediatamente al Médico si alguno de estos síntomas ocurre: reacciones de intolerancia gástrica caracterizada por vómitos, dolor abdominal, diarrea, constipación. Además se puede producir aumento de la sudoración, alteraciones de la salivación, hipotensión, hipertensión, taquicardia, urticaria, rash cutáneo, prurito, dermatitis, insomnio, agitación, alopecia, fotosensibilidad, broncoespasmo, ictericia. Si Ud. nota cualquier efecto molesto no mencionado consulte a su Médico.

Otros efectos son temporales y no requieren atención médica, salvo que estos sean muy molestos o se prolonguen en el tiempo: somnolencia, fatiga, mareos, náuseas, dolor de cabeza, palpitaciones, irritación gástrica.

Formas de administración:

Via oral.

Dosis:

El Médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular. No obstante, la dosis usual recomendada en adultos y niños mayores de 6 años es de 10 mg 1 vez al día.

Para niños de 2 a 5 años la dosis usual es de 5 mg 1 vez al día.

Sobredosis:

En caso de ingestión involuntaria, conduzca al intoxicado a un Centro de Atención Médico.

Condiciones de Almacenamiento:

Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no más de 30 °C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA**

V2
734212
07.11.18