FICHA PRODUCTO

Descripción Producto

: F-9902/21 Registro

: LORATADINA SOLUCIÓN ORAL 5 mg/5 mL Nombre

Referencia de Tramite Equivalencia Terapéutica o . Biosimilar

Titular : MINTLAB Co. S.A.

Estado del Registro : Vigente Resolución Inscríbase

Fecha Inscríbase : 08/01/1997 Ultima Renovación : 08/01/2021 Fecha Próxima renovación : 08/01/2026

Régimen : Fabricación Nacional

Vía Administración : ORAL

Condición de Venta : Receta Simple

Expende tipo establecimiento : Venta A Establecimiento A Y Asistencial

Indicado en la terapia paliativa de los síntomas producidos por rinitis alérgica estacional. También está indicada en Indicación

el manejo del prurito, eritema y urticaria asociada a urticaria idiopática crónica.

Envases

| Tipo Envase | Descripción Envase | Período Eficacia | Condición Almacenamiento | Contenido | Unidad Medida |
|----------------|--|------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|
| Envase Clínico | Frasco de plástico PET ámbar etiquetado, con tapa de aluminio. | 24 Meses | Almacenado A No Más De 30°c | 50 a 180 | mL |
| Muestra Médica | Frasco de plástico PET ámbar etiquetado, con tapa de aluminio. | 24 Meses | Almacenado A No Más De 30°c | 10 a 180 | mL |
| Venta Público | Frasco de plástico PET ámbar etiquetado, con tapa de aluminio. | 24 Meses | Almacenado A No Más De 30°c | 50-160 ó 50 a 180 | mL |

Función Empresa

| Función Empresa | Razón Social | País |
|--------------------------------|------------------|-------|
| FABRICACIÓN NACIONAL TERMINADO | MINTLAB CO. S.A. | CHILE |

Fórmula (sólo Principios Activos)

| Nombre PA | Concentración | Unidad Medida | Parte |
|------------|---------------|---------------|-------|
| LORATADINA | 0,100 | g | |



Instituto de Salud Pública de Chile

Av. Marathon 1000 Mesa Central Ñuñoa, Santiago Casilla 48 Correo 21 (56-2) 5755 101 Informaciones Código Postal 7780050 (56-2) 5755 201

Contacto con OIRS Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias



LORATADINA 5mg/5mL JBE. 60mL FCOS.

COMPOSICIÓN:

Loratadina Jarabe 5mg/5mL
Cada 5 mL (una cucharadita de Jarabe) contiene: Loratadina 5 mg.
Excipientes: Benzoato de sodio, Sacarina sódica Dihidritato, Sacarosa, Ácido cítrico anhidro, Propilenglicol, Polividona, esencia de cereza liquida, agua purificada.

CLASIFICACIÓN:

Antihistamínico (antialérgico).

INDICACIÓN:

Indicado en la terapia paliativa de los síntomas producidos por rinitis alérgica estacional. También está indicada en el manejo del prurito, el eritema y la urticaria asociada a urticaria idiopática crónica.

FORMA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía oral.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Antes de usar este medicamento debe sopesarse los riesgos y los beneficios en su uso, los que deben ser discutidos entre Ud. y su médico. Principalmente debe considerar los aspectos siguientes:

- Alergias: Ud. debe comunicar a su médico si alguna vez ha presentado una reacción alérgica a este medicamento o alguna otra sustancia, ya sea alimentos, preservantes, colorantes, saborizantes u otros medicamentos. Embarazo: Ud. debe comunicar a su médico si está embarazada o planea estarlo, ya que no se recomienda su uso en embarazadas.
- Lactancia: Ud. debe conversar con el médico acerca de la conveniencia del uso de este producto mientras esté amamantando. Este medicamento pasa a la leche materna por lo que no se recomienda su administración en mujeres que estén amamantando.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a la droga. Embarazo

INTERACCIONES:

El efecto de este medicamento puede modificarse por su administración junto a otros (interacciones). Ud. debe comunicar a su médico o farmacéutico todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta médica, antes de usar este fármaco. Administración conjunta con ketoconazol, eritromicina o cimetidina puede aumentar la concentración plasmática de Loratadina. Ud. no debe ingerir alcohol mientras toma este medicamento. No olvide mencionar que Ud. está tomando este medicamento en caso de requerir atención médica por otras razones, o en caso que se someta a algún examen..

EFECTOS ADVERSOS:

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Consulte inmediatamente al médico si alguno de estos síntomas ocurre: reacciones de intolerancia gástrica caracterizada por vómitos, dolor abdominal, diarrea, constipación. Además, se puede producir aumento de la sudoración, alteraciones de la salivación, hipotensión, hipertensión, taquícardia, urticaria, rash cutáneo, prurito, dermatitis, insomnio, agitación, alopecia, fotosensibilidad, broncoespasmo, ictericia.



LORATADINA 5mg/5mL JBE. 60mL FCOS.

DOSIS:

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular. No obstante, la dosis usual recomendada en adultos y niños mayores de 6 años es de 10 mg 1 vez al día. Para niños de 2 a 5 años la dosis usual es de 5 mg 1 vez al día.

SOBREDOSIS:

En caso de ingestión involuntaria, conduzca al intoxicado a un centro de atención médico.