

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

TOBRAMICINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0,3%

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su médico.

Composición

Cada 100 ml de solución oftálmica contiene:

Tobramicina (como sulfato).....300 mg

Excipientes: ~~Cloruro de Benzalconio, ácido bórico, cloruro de sodio, hidróxido de sodio, agua purificada c.s.~~

Incluir listado cualitativo de excipientes según la fórmula aprobada en el registro sanitario.

Clasificación

Antibiótico oftálmico.


Indicaciones

Está indicado en el tratamiento infecciones externas del ojo y de las áreas adyacentes ocasionadas por bacterias susceptibles. Una vigilancia apropiada de la respuesta a la terapia con antibióticos tópicos debe ser acompañada al uso de tobramicina.

~~Tratamiento de las infecciones externas del ojo y sus anexos, causados por microorganismos sensibles.~~

Posología

- El médico debe indicar la posología y tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular.



FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
TOBRAMICINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0,3%

Modo de uso

Solo para uso tópico, en la conjuntiva ocular.

Primero lave sus manos. Si Ud. usa lentes de contacto, proceda a retirarlos antes de aplicar este medicamento. Incline la cabeza hacia atrás, presione con su dedo sobre la piel justo debajo de la parte inferior del párpado y empuje suavemente hacia abajo para crear un espacio. Deje caer la gota del medicamento dentro de este espacio. Suelte el párpado y cierre suavemente los ojos. No pestañee. Mantenga los ojos cerrados y aplique una pequeña presión con su dedo a la altura del lagrimal por 1 ó 2 minutos, para permitir que el medicamento se mantenga en contacto con la zona afectada.

Posteriormente lave sus manos para remover cualquier resto de medicamento adherido.

Evite el contacto directo del aplicador con la zona afectada o con cualquier otra superficie para prevenir la contaminación de la solución.

Si debe hacer uso de dos soluciones oftálmicas diferentes, deje transcurrir al menos 5 minutos entre ambas instilaciones para evitar el efecto de arrastre.

Cumpla estrictamente el tratamiento: no use más cantidad, con más frecuencia ni durante más tiempo que lo prescrito por su médico.

Si Ud. olvida una dosis, aplíquela lo antes posible; no lo haga si falta poco tiempo para las dosis siguientes. No duplique la dosis.

Contraindicaciones

Si Ud. sufre alguna enfermedad, debe consultar al médico antes de usar este medicamento. No usar en los siguientes casos:

Personas que han desarrollado una reacción alérgica previa a la tobramicina u otros medicamentos relacionados, tales como; gentamicina, amikacina, lincomicina, netilmicina, estreptomina o tobramicina inyectable.

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
TOBRAMICINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0,3%

Reacciones adversas

Si Ud. presenta alguna de las siguientes reacciones adversas mientras esté en tratamiento con este medicamento, acuda a un médico:

Picazón, enrojecimiento, hinchazón u otro signos de irritación en los ojos o párpados, ausente antes del uso de este medicamento.

El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos adversos que normalmente no requieren atención médica, a menos que sean demasiado molestos o no desaparezcan durante el curso del tratamiento:

Ardor o punzadas en los ojos.

Consulte a su médico si ocurre cualquier efecto adverso que no haya sido mencionado anteriormente.

Precauciones y advertencias

Use sólo por indicación y bajo supervisión médica.

Informe a su médico si Ud. alguna vez ha tenido reacciones alérgicas al efectuar un tratamiento con tobramicina, gentamicina o con cualquier otra sustancia (alimentos, colorantes, etc.) u otros medicamentos.

Informe a su médico si Ud. está embarazada o amamantando.

Efectúe visitas periódicas a su oftalmólogo, especialmente si su tratamiento es prolongado.

Consulte a su médico si nota que no hay mejoría después de unos pocos días o si los signos y síntomas de la infección tienden a agravarse.

Interacciones

Informe a su médico todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que Ud. ha adquirido sin receta.

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
TOBRAMICINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0,3%

Sobredosis

Cualquier medicamento utilizado en exceso puede acarrear serias consecuencias. Si Ud. sospecha una sobredosis, solicite atención médica inmediatamente.

Conservación

Almacenar a no más de 25°C, en su envase original.

Presentación

Frasco gotero X ml de solución oftálmica estéril.