INSTITUTO DE GALUD PUBLICA Departemento Contre. Mecionel Sección Registro DEPARTMENTO DE COMADENACIONAL REGISTRO Nº 21-426

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

NEO-PANKREOFLAT Comprimidos con recubrimiento entérico

Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte al Farmacéutico.

COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN:

Cada Comprimido con recubrimiento entérico contiene:

Pancreatina

170 mg

(Correspondiente a:

5.500 Unidades FIP de amilasa

6.500 Unidades FIP de lipasa

400 Unidades FIP de proteasa)

Dimetilpolisiloxano (Como silicona)

80 mg

Excipientes c.s.

24 comprimidos con recubrimiento entérico.

CLASIFICACIÓN: Antiácido, Antiaerofágico.

FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE

RECOMENDACIÓN DE USO:

Alivia el malestar producido por los trastornos de la digestión y flatulencia. Meteorismo.

ADVERTENCIAS:

No tome este medicamento si usted es alérgico a este medicamento o a alguno de sus componentes. El uso permanente o por períodos prolongados, sólo debe hacerse por indicación médica.

Embarazo y Lactancia:

No administrar a mujeres embarazadas o que amamantan, salvo prescripción médica.

Niños:

No administrar a menores de 12 años.

PRECAUCIONES

Se recomienda no exceder la dosis indicada, a menos que el médico prescriba una dosis diferente.

Cualquier paciente que reciba una preparación a base de enzimas pancreáticas que se queja de nuevos síntomas abdominales o cambio de los síntomas anteriores debe ser estudiado para excluir una posible patología del colon.

CONTRAINDICACIONES: No use este medicamento si usted presenta alguna de las siguientes condiciones:

Dolor abdominal, fiebre, vómitos y pancreatitis aguda o crónica

EFECTOS ADVERSOS:

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados, además de los que se pretende obtener. Cualquier medicamento puede producir efectos no deseados, especialmente si se toman por un período prolongado de tiempo y/o en dosis grandes.

Si aparece cualquiera de los síntomas siguientes deje de tomar el medicamento y consulte al médico:

- Náuseas
- Diarreas.

DOSIS Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:

La dosis usual es de 1 a 2 comprimidos antes de las comidas. No masticar ni fraccionar. A criterio médico, pueden ser instituidos otros esquemas terapéuticos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Mantener lejos del alcance de los niños. Mantener en su envase original y protegido del calor, la luz y la humedad. No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. No recomiende este medicamento a otra persona

