

CAPRIMIDA®D



PRODUCTO	
Nombre	CAPRIMIDA - D CÁPSULAS
Principio Activo	Calcio – Vitamina D3
Excipientes	Polividona, laurilsulfato de sodio, estearato de magnesio, colorante FD y C rojo N°40, colorante FD y C azul N° 1, dióxido de titanio.
Registro Isp	F-14353
Fecha de Aprobación	13-12-2004
Equivalencia Terapéutica	
Vías de Administración	Oral
Periodo de Eficacia	24 meses
Periodo de Estabilidad Refrigerada	N/A
Periodo de Estabilidad Temp. Ambiente En Envase Primario	24 meses
ENVASE	
Condiciones de Almacenamiento	Almacenado A No Más De 30°C
Unidad de Medida	Cápsulas

Envase Primario	Blister pack compuesto por lámina de PCV-Aclar transparente impreso.
Envase Secundario	Estuche de cartulina impreso.
FABRICANTES	
Principios Activos/ Gmp Api	BREWSTER FOODS/BASF SE
Fabricante / Gmp Planta/ Pt	LABORATORIOS RECALCINE S.A.
Distribuidor / Gmp Planta	LABORATORIOS RECALCINE S.A.

INFORMACIÓN GENERAL	
ACCIÓN TERAPEUTICA	
Suplemento vitamínico	
INDICACIONES	
Prevención y tratamiento de estados carenciales de calcio que estén asociados a un déficit de vitamina D. Coadyuvante en la reparación de fracturas óseas. Coadyuvante en el tratamiento de la osteoporosis de diversas etiologías: senil, inducida por corticosteroides o como consecuencia de una inmovilización.	

POSOLOGÍA

Dosis usual para adultos: 1 a 2 cápsulas 2 veces al día.

CONTRAINDICACIONES

Antecedentes de hipersensibilidad a los suplementos de calcio.
Hipercalcemia, hipercalciuria, cálculos renales, sarcoidosis, hipervitaminosis D, litiasis cálcica, osteodistrofia renal con hiperfosfatemia.

CERTIFICACIONES

Autoridad
Regulatoria de
Países de Alta
Vigilancia