FICHA TÉCNICA	
Nombre aprobado por Instituto de Salud Pública.	- TEGRETAL CR COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN SOSTENIDA 200 mg
Principio activo	- Carbamazepina
Excipientes	<ul> <li>Núcleo: Celulosa microcristalina, Carboximetilcelulosa sódica, copolímero de éster etílico del ácido acrílico y éster metílico del ácido metacrílico, Dispersión coloidal de etilcelulosa - alcohol cetílico - laurilsulfato de sodio, talco, dióxido de silicio coloidal, estearato de magnesio.</li> </ul>
	- <b>Recubrimiento:</b> Hipromelosa, Talco, Dióxido de titanio, Polisorbato 80, Óxido de hierro amarillo, Óxido de hierro rojo.
N° de Registro I.S.P	- F-4376/20
Forma farmacéutica / Descripción	- Comprimidos beige naranja, ovalados, ligeramente biconvexo con ranura en ambos lados y "H/C" grabado en un lado y "C/G" en el otro
Período de eficacia, condición de almacenamiento y descripción envase.	<ul> <li>24 meses, almacenado a no más de 30°C, en estuche de cartulina impreso o etiquetado que contiene blíster de PVC/PE/PVDC/Aluminio impreso, más folleto de información al paciente. Todo debidamente sellado.</li> </ul>
Estatus de Bioequivalencia	- Producto Referente
Código ATC	- N03AF01
Grupo Terapéutico	- Antiepiléptico, neurótropo y psicofármaco.
Indicación Terapéutica	Epilepsia: Convulsiones epilépticas parciales con sintomatología compleja o simple (con o sin pérdida del conocimiento), con o sin generalización secundaria. Convulsiones tonicoclónicas generalizadas. Formas epilépticas mixtas.  Tegretal se puede administrar tanto en monoterapia como en terapia combinada.  Tegretal no suele ser eficaz contra las ausencias (ausencias típicas) y las convulsiones mioclónicas.  Manía aguda y tratamiento de mantenimiento de los trastornos afectivos bipolares para prevenir o mitigar la recidiva.  Síndrome de abstinencia alcohólica.  Neuralgia idiopática del trigémino y neuralgia del trigémino por esclerosis múltiple o en placas (tanto típica como atípica). Neuralgia idiopática del glosofaríngeo.  Neuropatía diabética dolorosa.

	<ul> <li>Diabetes insípida central. Poliuria y polidipsia de origen neurohormonal.</li> </ul>
Presentaciones Registradas	<ul> <li>Venta público: Estuche de cartulina impreso con blíster de PVC/PE/PVDC/Aluminio impreso que contiene de 1 a 100 comprimidos de liberación sostenida.</li> <li>Envase clínico: Estuche de cartulina impreso con blíster de PVC/PE/PVDC/Aluminio impreso que contiene de 1 a 100 comprimidos de liberación sostenida.</li> <li>Muestra médica: Estuche de cartulina impreso con blíster de PVC/PE/PVDC/Aluminio impreso que contiene de 1 a 100 comprimidos de liberación sostenida.</li> </ul>
Presentaciones y tipo de envase comercializados	- Estuche con blister con 20 o 60 comprimidos
	- Novartis Pharma AG Chemical Operations Switzerland Lichtstrasse 35, 4056 Basel Suiza
Fabricante(s) Principio activo / Dirección.	- Novartis Pharma Stein A.G. Shaffheusser strasse N° 4332, Stein Suiza
	<ul> <li>Zhejiang Rayboe Pharmaceutical Co. Ltd.</li> <li>N°18, Nanyangsan Road, Linhai, Taizhou City, Zhejiang Province China.</li> </ul>
Fabricante y/o empacador(es) Producto Terminado / Dirección	<ul> <li>Anovis Industrial Farmacéutica Ltda</li> <li>Av. Ibirama N° 518, Taboao da Serra,</li> <li>Brasil.</li> </ul>
Procedente(s)	- Brasil
Aprobación Autoridad Regulatoria de Alta Vigilancia Sanitaria.	- Cuenta con aprobación de FDA y ANVISA
Cadena de frío.	- No aplica para este producto.
Condición de venta.	- Bajo receta médica en Establecimientos Tipo A y Asistencial
Fecha de aprobación I.S.P	- 11 de abril de 1988
Fecha de la próxima renovación I.S.P	- 10 de abril de 2025
Distribución.	- PERILOGISTICS LTDA NOVOFARMA SERVICE S.A.