



FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE



DALUN®

**Hidroxizina 10 mg/5 mL
Jarabe**



Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su médico.

1 COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN:

Cada 100 mL de jarabe contiene:

Hidroxizina	200 mg
Excipientes	c.s.

Excipientes: Metilparabeno-Sacarosa-Esencia de frutillas- Agua purificada.

Envase con frasco de vidrio ámbar que contiene 60-100-120-150-200 ml de jarabe.

2 VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administración por vía oral.

3 CLASIFICACIÓN:

Antihistamínico



26 DIC 2003

4 INDICACIÓN:

DALUN jarabe está indicado para el alivio sintomático de manifestaciones menores de la ansiedad y tensión asociada con la psiconeurosis y como medicamento complementario en enfermedades orgánicas en que se manifieste ansiedad.

DALUN jarabe es útil en el manejo del prurito debido a condiciones alérgicas tales como urticaria crónica, dermatosis de contacto y atópicas, y en prurito mediado por histamina.

5 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Antes de usar este medicamento debe sopesarse los riesgos y beneficios en su uso, los que deben ser discutidos entre Ud. y su médico.

- Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica.
- No utilizar este medicamento en el embarazo y lactancia a menos que su médico lo indique.
- No tome este medicamento si es alérgico a cualquier antihistamínico.
- Consulte a su médico si padece de: glaucoma, hipertrofia prostática, asma, úlcera péptica o enfermedades renales, si piensa operarse dentro de los 2 meses siguientes, incluyendo cirugía dental, con anestesia total o lumbar (epidural).
- Si tiene más de 60 años: Las reacciones adversas y los efectos secundarios pueden ser más frecuentes y severos que en personas más jóvenes, sobre todo: dificultad para orinar, agilidad mental y reflejos disminuidos y otros síntomas cerebrales y del sistema nervioso.
- No exceda las dosis recomendadas.
- Embarazo: No se han comprobado daños al feto. Evitar en lo posible.
Lactancia: La droga pasa a la leche materna. Deje de tomar el medicamento o de dar el pecho.

FOLLETO DE INFORMACIÓN
AL PACIENTE

- Niños: No se recomienda en niños prematuros o recién nacidos.
- Tomar el sol puede provocar erupciones o intensificar las quemaduras del sol en zonas expuestas al sol o a lámparas solares.
- Estado de alerta: No conduzca vehículos ni maneje maquinarias hasta saber cómo le afecta la medicina.
- El riesgo aumenta si bebe alcohol o toma medicamentos que modifiquen su agilidad mental o reflejos, como otros antihistamínicos, tranquilizantes, sedantes, analgésicos, narcóticos y drogas que afectan la mente.

6 CONTRAINDICACIONES:

Hidroxizina está contraindicado en pacientes que presenten hipersensibilidad al principio activo.
Pacientes con riesgo de glaucoma por estrechez del ángulo, o con riesgo de retención urinaria debido a problemas uretroprostáticos.

FOLLETO DE INFORMACION
AL PACIENTE

7 INTERACCIONES:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (interacciones). Ud. debe comunicar a su médico de todos los medicamentos que está tomando ya sea con o sin receta médica antes de usar este fármaco, sobretodo si se trata de tranquilizantes o anticolinérgicos.

8 PRESENCIA DE OTRAS ENFERMEDADES:

El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos.

Ud. debe comunicar a su médico si padece de alguna enfermedad.

9 EFECTOS ADVERSOS (no deseados):

Los medicamentos pueden producir efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Algunos de estos efectos requieren atención médica.

Los efectos secundarios más frecuentes son: somnolencia, mareos, sequedad de boca, de garganta, de nariz, náuseas.

Menos frecuentes: alteraciones de la visión, torpeza, urticaria, menor tolerancia a los lentes de contacto, micción dolorosa o difícil, pérdida de apetito.

Raros: pesadillas, agitación, irritabilidad, dolor de garganta, fiebre, pulso rápido, hemorragias o hematomas inusuales, fatiga, debilidad, confusión.

10 DOSIS:

La que su médico indique.

No tome más que la cantidad prescrita por su médico. Si olvida una dosis, tómela lo antes posible, no lo haga si falta poco tiempo para la dosis siguiente. No duplique las dosis.

11 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor, la luz y humedad, a no más de 25°C. No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN INDICACIÓN MÉDICA.

NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA.

