

Nevanac Nepafenac 0,1% Solución Oftálmica 5 mL



¿Para qué enfermedades o condiciones se prescribe este medicamento?

Indicado para el tratamiento de los cuadros de dolor e inflamación relacionados con la cirugía de cataratas.

¿Qué precauciones debo tener al usar este medicamento?

Instilar 1 gota en cada ojo afectado 3 veces al día, comenzando 1 día antes de la cirugía de cataratas y continuando el día de la intervención (es decir, el día de la cirugía) y durante las primeras 2 semanas del período post-operatorio o post-quirúrgico. Agitar bien antes de usar.



Contraindicaciones: Está contraindicado en aquellos pacientes con hipersensibilidad previamente demostrada a cualquiera de los componentes de esta formulación o a otros antiinflamatorios no esteroideos.

Ficha técnica

NEVANAC

Laboratorio: NOVARTIS

Drogas:

- Nepafenac

Acciones:

- Oftálmicos:Protectores Visuales

Acciones:

- Cada ml de suspensión oftálmica estéril contiene: Nepafenaco 0.1%.
Preservante: Cloruro de Benzalconio al 0.005%. Excipientes: Manitol; Carbomer 974P; Cloruro de Sodio; Tiloxapol; Edetato Disódico; Acido Clorhídrico y/o Hidróxido de Sodio (para ajustar el pH) y Agua Purificada.
- Indicado para el tratamiento de los cuadros de dolor e inflamación relacionados con la cirugía de cataratas.
- Instilar 1 gota en cada ojo afectado 3 veces al día, comenzando 1 día antes de la cirugía de cataratas y continuando el día de la intervención (es decir, el día de la cirugía) y durante las primeras 2 semanas del período post-operatorio o post- quirúrgico. Agitar bien antes de usar.
- Está contraindicado en aquellos pacientes con hipersensibilidad previamente demostrada a cualquiera de los componentes de esta formulación o a otros antiinflamatorios no esteroideos.
- Envase Drop-Tainer^{MR} conteniendo 5 mL.