

BIOPSOL

ABBOTT

Antiparkinsoniano.

Composición.

Cada comprimido contiene: pramipexol diclorhidrato monohidrato 0,25mg y 1mg.

Indicaciones.

Tratamiento de los signos y síntomas de la enfermedad de Parkinson idiopático, como monoterapia en la fase inicial y asociada a levodopa en la etapa avanzada de la enfermedad.

Dosificación.

(como sal) oral, ingerida con agua, con o sin alimentos; dividida en dosis iguales, 3 veces por día. *Tratamiento Parkinson inicial:* aumentar la dosis gradualmente. *Dosis de comienzo:* 0.375 mg/día, aumentando cada 5-7 días. Titular la dosis para lograr el máximo efecto terapéutico. *Escala de aumento de dosis:* *1a semana:* 3 veces por día, 0.125 mg. *2a semana:* 3 veces por día, 0.25 mg. *3a semana:* 3 veces por día, 0.5 mg, dosis diaria total. Si es necesario: aumentar la dosis diaria 0.75 mg/semana hasta 4.5 mg/día. *Tratamiento de mantenimiento:* 0.375 mg a 4.5 mg/día. Suspensión del tratamiento: proceder gradualmente. *Tratamiento combinado con levodopa:* reducir la dosis de levodopa durante el aumento de dosis y el mantenimiento, para evitar estimulación dopaminérgica excesiva. *Dosis en insuficiencia renal:* Clearance de creatinina > de 50 ml/min.: no ajustar. Entre 20-50 ml/min.: dividida en 2 dosis, comenzando con 0.125 mg 2 veces/día. Clearance < 20 ml/min.: dosis diaria única, comenzando con 0.125 mg/día. Si la función renal declina aún más reducir la dosis diaria en forma proporcional. *Dosis en insuficiencia hepática:* no es necesario modificar. *Tratamiento SPI:* Inicio con 0.125 mg una vez al

día 2 a 3 horas antes de acostarse. De ser necesario aumentar la dosis, pasar a 0,25 mg 1 x día por 4-7 días. Para pacientes que requieren control adicional, seguir con 0.5 mg 1 x día por 4-7 días. De ser necesario aumentar a 0.75 mg. Pacientes con alteración hepática y/o renal no requieren de ajuste de dosis.

Presentación.

Estuche con 30 comprimidos de pramipexol 0,25mg. Estuche con 30 comprimidos de pramipexol 1mg.

