

Hassapirin Puro Acido Acetilsalicilico 500 mg 20 Comprimidos





HASSAPIRIN

Laboratorio: MINTLAB

Drogas:

- Acetilsalicílico, ácido

Acciones:

- Aparato Locomotor: Antiinflamatorios no Esteroides
- Sistema Nervioso Central: Analgésicos Antitérmicos

Acciones:

- **Comprimidos:** Cada comprimido contiene: Ácido Acetilsalicílico 500 mg. Excipientes: Croscarmelosa Sódica, Almidón de Maíz, Celulosa Microcristalina. **Comprimidos masticables:** Cada comprimido masticable contiene: Ácido Acetilsalicílico 100.0 mg. Excipientes: Croscarmelosa Sódica, Almidón de Maíz, Esencia de Vainilla Polvo, Esencia de Frutilla Polvo, Celulosa Microcristalina, Sucralosa.
- Analgésico. Antiinflamatorio. Antiinflamatorio no esterooidal.
- Este medicamento se usa como analgésico en el tratamiento del dolor leve a moderado asociado a inflamación y para reducir la fiebre.
- **Forma de administración:** Vía oral. **Dosis: Hassapirin comprimidos 500 mg:** *Adultos y niños mayores de 12 años:* 1 ó 2 comprimidos, 3 a 4 veces al día. En reumatismo, de 6 a 12 y hasta 16 comprimidos en el día (control médico). **Hassapirin comprimidos masticables 100 mg:** Niños lactantes según indicación médica. *Niños de 1 a 3 años:* 1 comprimido masticable, 3 veces al día. *Niños de 4 a 6 años:* 2 comprimidos masticables, 3 veces al día. *Niños de 7 a 9 años:* 3 comprimidos masticables, 3 veces al día. Consultar la dosis al pediatra para niños menores de 12 años.
- **Hassapirin comprimidos 500 mg:** administrar con líquidos o comida. **Hassapirin comprimidos masticables 100 mg:** masticar los comprimidos masticables.
- Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. **Consulte inmediatamente al médico si alguno de estos síntomas ocurre:** Hemorragia gastrointestinal, dolor epigástrico, acidez estomacal, erupciones de la piel, zumbido de oídos, dolor de cabeza continuo o severo. *Otros efectos son temporales y no requieren atención médica, salvo que estos sean muy molestos o se prolonguen en el tiempo:* malestar gástrico, náuseas.
- No administrar en adultos o niños con fiebre mayor a 39 °C, que persista por más de 3 días. No usar en pacientes con hipersensibilidad a los salicilatos. No usar en niños con varicela o influenza debido al riesgo de la aparición del síndrome de Reye. No usar en pacientes con tendencias a hemorragias y úlceras.
- Hassapirin aumenta el riesgo de ulceración gastrointestinal durante el período de embarazo. Usar con precaución en lactancia. Suspender Hassapirin al menos 1 semana



antes de una intervención quirúrgica. Precaución en niños deshidratados por ser éstos preferentemente susceptibles a la intoxicación por salicilatos. Si tomando Hassapirin el dolor continúa por más de 7 días en adultos o 5 días en niños, consulte al médico. Debe comunicar a su médico si sufre o ha sufrido problemas de sangramiento gastrointestinal o úlceras estomacales.

- **Se han descrito interacciones con los siguientes medicamentos:** Anticoagulantes orales, heparina, clorpropamida, tolbutamida, penicilinas y cefalosporinas, ácido valproico, fenitoína, agentes uricosúricos, metotrexato, espironolactona, alcohol. **Presencia de otras enfermedades:** El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos. *En caso de sufrir alguna enfermedad usted debe consultar al médico o farmacéutico antes de ingerir este medicamento, especialmente en los casos siguientes:* Anemia, enfermedad renal o hepática, gota, asma, hipertensión.
- En caso de ingestión involuntaria conduzca inmediatamente al intoxicado a un centro de atención médica hospitalaria.
- **Condiciones de almacenamiento:** Mantener lejos del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, la luz y la humedad, a no más de 25 °C.
- No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.