



DONTER[®]
Comprimidos 250 mg



FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su Médico o Químico-Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponde exactamente al indicado por su Médico.

Composición:

Cada comprimido contiene:
Terbinafina (como clorhidrato) 250 mg
Excipientes: Lauril Sulfato de Sodio, Croscarmelosa Sódica, Dióxido de Silicio Coloidal, Hipromelosa, Ácido Esteárico, Celulosa Microcristalina.

Clasificación:

Antimicótico.

Indicación:

Tratamiento de infecciones de la piel y uñas causadas por dermatófitos como Trichophyton, Microsporum canis, Epidermophyton floccosum y Candida donde la terapia oral se considera apropiada debido al lugar, gravedad o extensión de la piel.

Advertencias:

- Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica.
- Es importante aplicar el tratamiento por el tiempo completo prescrito.
 - No usar en niños menores de 12 años.
 - Evitar su uso durante el embarazo y lactancia.

Contraindicaciones:

Si su Médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

- Pacientes hipersensibles a Terbinafina o a algún componente de la formulación.

Interacciones:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (Interacciones). Ud. debe comunicar a su Médico o Farmacéutico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta médica, antes de usar este fármaco, especialmente: Fenitoína, Ácido Valproico, Plicamicina, Verapamilo, Cafeína, Cimetidina, Rifampicina. Ud. no debe beber Alcohol mientras esté en tratamiento con este medicamento.

Reacciones Adversas:

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Consulte inmediatamente al Médico si alguno de estos síntomas ocurre: ictericia, pérdida del apetito, orina oscura, rash cutáneo, picazón o enrojecimiento de la piel, dolor de músculos y articulaciones, dificultad para tragar, fiebre, escalofríos o dolor de garganta, cansancio o debilidad inusuales, dolor de cabeza continuo.

Otros efectos son temporales y no requieren atención médica, salvo que estos sean muy molestos o se prolonguen en el tiempo: diarrea, náuseas, vómitos, dolor de estómago, pérdida o cambios en el gusto.

Dosis:

El Médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular: No obstante, la dosis usual recomendada es de 250 mg al día.

Sobredosis:

En caso de ingestión involuntaria, trasladar inmediatamente al intoxicado a un Centro de Atención Médico.

Condiciones de Almacenamiento:

Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no más de 25 °C. No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA**



V1
731293
29.01.15

Versión : 1	Fecha Creación: 29.01.15	V°B° Comercial	V°B° Dirección Técnica
Cód. Insumo (SGA): 731293		Nombre: <i>Alto 1600</i>	Nombre: <i>OF CARLOS SILVA MUÑOZ</i>
Descriptor Insumo: DONTER 250 mg COMP. FOLLETO PACIENTE SD		Fecha: <i>25-02-2015</i>	Fecha: <i>03/03/2015</i>
Medidas (mm) : 115 x 120 mm		Firma: <i>[Firma]</i>	Firma: <i>[Firma]</i>
Escala : 1:1	Tacas: 979	Observaciones	
Control de Cambios ☐ Si ☐ No		<i>nuevas medidas 120 x 115 mm</i>	
☐ Sanitario ☐ Diseño ☐ Fabril ☐ Otro			
Especificar:			

Pantone:

C	Y
M	K

