

Donter Terbinafina 1% Crema Dermica 15 gr



DONTER Crema Dérmica
Laboratorio: MINTLAB



Drogas:

- Terbinafina, Clorhidrato

Acciones:

- Piel y Mucosas: Antimicóticos Tópicos

Acciones:

- Cada 100 g de crema contiene: Terbinafina Clorhidrato 1.0 g. Excipientes: Alcohol Cetoestearílico, Alcohol Bencílico, Polioxil 20 Cetoestearil Eter, Propilenglicol, Fosfato de Sodio, Monobásico Monohidrato, Vaselina Líquida, Vaselina Sólida, Agua Purificada.
- Antimicótico.
- Tratamiento de tinea corporis, tinea cruris y tinea pedis interdigital y plantar, tinea capitis y onicomycosis.
- El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado para su caso particular. No obstante, se recomienda aplicar una capa suficiente de crema 1 ó 2 veces al día sobre la parte afectada. La duración del tratamiento es variada y depende de las dimensiones y localización de la afección; en general, es de 1-2 semanas y no excede de 4 ó 6 semanas.
- Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. **Consulte inmediatamente al médico si ocurre:** rash cutáneo. **Otros efectos son temporales y no requieren atención médica, salvo que éstos sean muy molestos o se prolonguen en el tiempo:** picazón, ardor o enrojecimiento de la piel o cualquier signo de irritación de la piel no presente antes de comenzar el tratamiento.
- **Si su médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no debe usar este medicamento en los siguientes casos:** Pacientes hipersensibles a la droga o a algún componente de la crema. El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (Interacciones). Ud. debe comunicar a su médico o farmacéutico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta médica, antes de usar este fármaco. No se han descrito interacciones con otros medicamentos al aplicar terbinafina clorhidrato en forma tópica.
- Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica. No usar la crema para uso oftalmológico y evitar su contacto con nariz, boca u otras membranas mucosas. Es muy irritante. Es importante aplicar el tratamiento por el tiempo completo prescrito. No usar en niños menores de 12 años.
- Debido a la baja absorción de terbinafina clorhidrato crema, no hay antecedentes de casos de sobredosis.
- **Condiciones de almacenamiento:** Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, tapado, protegido del calor, la luz y la humedad, a no más de 25° C.
- Envase conteniendo 15 g.