

## Hassapirin Infantil Ácido Acetilsalicílico 100 mg 20 Comprimidos





### **Hassapirin Infantil Ácido Acetilsalicílico 100 mg 20 Comprimidos**

#### **¿Para qué enfermedades o condiciones se prescribe este medicamento?**

La terapia con ácido acetilsalicílico (aspirin) es muy útil para personas con EAC o con antecedentes de accidente cerebrovascular. Si usted ha sido diagnosticado con EAC, su proveedor de atención médica puede recomendarle tomar una dosis diaria (de 75 a 162 mg) de este medicamento. Se recomienda una dosis diaria de 81 mg para personas que han tenido una intervención coronaria percutánea (angioplastia). Con frecuencia se receta con otro medicamento antiplaquetario. El ácido acetilsalicílico (aspirin) puede reducir el riesgo de tener un ataque cardíaco y un accidente cerebrovascular isquémico. Sin embargo, utilizar este medicamento por mucho tiempo puede elevar el riesgo de sangrado estomacal. La dosis diaria de ácido acetilsalicílico (aspirin) no debe usarse para fines de prevención en personas saludables que tengan un bajo riesgo de desarrollar una enfermedad cardíaca. Su proveedor considerará su condición médica general y factores de riesgo de tener un ataque cardíaco antes de recomendar esta terapia.

#### **¿Qué precauciones debo tener al usar este medicamento?**

Antes de iniciar esta terapia, coménteles a su proveedor si tiene problemas de sangrado o úlceras estomacales. Igualmente coménteles si está embarazada o amamantando.