

VALNOC

ABBOTT

Hipnótico no benzodiazepínico.

Composición.

Cada comprimido recubierto contiene: 2mg de eszopiclona. Cada comprimido recubierto contiene: 3mg de eszopiclona.

Indicaciones.

Tratamiento del insomnio, tanto para mejorar la inducción como para el mantenimiento del sueño.

Dosificación.

La dosis de Valnoc debe adaptarse a cada paciente en particular. *Adultos:* La dosis inicial recomendada es de 2 mg, inmediatamente antes de acostarse. Como la dosis de 3 mg es más eficaz para mantener el sueño, el tratamiento puede iniciarse con esta dosis o puede ser aumentada hasta este valor si el tratamiento se ha iniciado con una dosis menor. *Ancianos:* En los pacientes ancianos que sufren principalmente de dificultad para conciliar el sueño, la dosis inicial recomendada es de 1 mg inmediatamente antes de acostarse. En estos pacientes, la dosis puede aumentarse hasta 2 mg si existe indicación clínica. En los pacientes ancianos, que sufren principalmente de dificultad para mantener el sueño, la dosis recomendada es de 2 mg inmediatamente antes de acostarse. Se recomienda no administrar Eszopiclona conjunta o inmediatamente después de ingerir alimentos con alto contenido de grasas, estos pueden retrasar la absorción del fármaco y reducir el efecto sobre la latencia del sueño. *Pacientes con insuficiencia hepática:* En pacientes con insuficiencia hepática grave la dosis inicial recomendada es de 1 mg. No es necesario modificar la dosis en la insuficiencia leve a moderada. Eszopiclona debe usarse con precaución en estos pacientes. *Administración concomitante con inhibidores de la*

CYP3A4: La dosis inicial de Valnoc no debe ser mayor que 1 mg en pacientes que reciben la administración concomitante de inhibidores potentes de la isoenzima CYP3A4. En caso necesario, la dosis puede aumentarse a 2 mg.

Presentación.

Envase de 2mg por 30 comprimidos recubiertos. Envase de 3mg por 30 comprimidos recubiertos.