

PIASCLEDINE

ANTIARTRÓSICO



CLASIFICACIÓN TERAPÉUTICA

Antiartrósico Sintomático de Acción Lenta (AASAL).

COMPOSICIÓN

PIASCLEDINE está constituido por dos componentes: Persea Gratissima y Glycine Max, en la forma de insaponificables. Estos compuestos insaponificables han probado ser efectivos en el manejo de episodios dolorosos de osteoartritis, ya que ellos parecen retardar su desarrollo. Diversos estudios desarrollados in-vitro e in-vivo han confirmado los efectos beneficiosos de la asociación de insaponificables de PIASCLEDINE sobre el cartílago. Además, se han actualizado los primeros estudios de toxicidad subaguda y aguda mediante la realización de estudios recientes de toxicidad crónica, embriotoxicidad y teratogenicidad, como también por tests de mutagenicidad, con el objeto de confirmar la excelente tolerancia del producto.

Cada cápsula contiene: Extracto total de insaponificables de Persea Gratissima y Glicine Max 300 mg. correspondiente a: Insaponificables de Persea Gratissima 100 mg, Insaponificables de Glicine Max 200 mg Excipientes: Butilhidroxitolueno; Sílice coloidal anhidra (Aerosil) c.s.

INDICACIÓN

PIASCLEDINE está indicado en el tratamiento de apoyo en enfermedades osteoartrosicas (osteoartríticas)

MECANISMO DE ACCIÓN

PIASCLEDINE mejora el mecanismo de recuperación del cartílago artrosico, porque estimula la síntesis de los componentes de la matriz articular y disminuye la destrucción del cartílago. Estudios in vitro han demostrado que PIASCLEDINE estimula la síntesis del factor de crecimiento transformador beta ($TGF-\beta$) y la expresión del inhibidor del activador del plasminógeno (PAI-1); al mismo tiempo PIASCLEDINE inhibe la liberación de interleuquina 1 (IL-1) y factor de necrosis tumoral alfa ($TNF-\alpha$) por el condrocito y por tanto la actividad de las metaloproteasas que degradan el cartílago articular. PIASCLEDINE interviene finalmente en el proceso de degradación del cartílago, restableciendo el equilibrio entre anabolismo y catabolismo en la matriz cartilaginosa. Estos efectos, a nivel

clínico, se traducen en disminución del dolor y del consumo de analgésicos, mejoría de la rigidez y de la función articular.

EFFECTOS ADVERSOS

Son muy poco frecuentes. En algunos casos han sido descrito casos de malestar gástrico sin relevancia. También se han presentado casos leves de regurgitación, la cual disminuye o se elimina, administrando el producto junto con las comidas. En casos excepcionales pueden verse reacciones de hipersensibilidad a algunos de los componentes de la fórmula.

PRECAUCIONES

PIASCLEDINE no debe ser ingerido por personas alérgicas a uno de los componentes de la fórmula.

CONTRAINDICACIONES

No se aconseja su uso en pediatría por no existir trabajos clínicos en este grupo etario. No debe utilizarse durante el embarazo y la lactancia, salvo indicación médica expresa.

INTERACCIONES E INCOMPATIBILIDADES

No han sido descritas.

SOBREDOSIS (INTOXICACIÓN)

No han sido descrito casos de sobredosis. Si se sospecha un accidente por sobredosificación, se aconseja vigilancia y tratamiento sintomático.

POSOLOGÍA

La dosis recomendada para el tratamiento del dolor y rigidez articular provocado por la artrosis es de una cápsula de PIASCLEDINE al día, tomado junto con las comidas principales o con abundante agua.

PRESENTACIÓN

PIASCLEDINE se presenta en un envase con 30 cápsulas.