

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
PIASCLEDINE CÁPSULAS
~~EXTRACTO TOTAL DE INSAPONIFICABLES DE ACEITE DE PERSEA~~
~~GRATISSIMA Y GLYCINE MAX 300 mg~~
Vía Oral
CÁPSULAS

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

COMPOSICIÓN:

Cada cápsula contiene:

Extracto total de insaponificables de aceite de
Persea gratissima (Gaertn) y *Glycine max* L. 300 mg

Compuesto por:


Insaponificables de Aceite de pulpa de

Persea gratissima (Gaertn) 100 mg

Insaponificables de Aceite de *Glycine max* L. 200 mg


Excipientes: Butilhidroxitolueno, **dióxido de silicio coloidal (Aerosil)** c.s.

Cápsula: dióxido de titanio (E171) C.I. 77891, tinta negra de impresión, colorante eritrosina FD&C rojo N° 3 C.I. 45430, óxido amarillo de hierro (E172) C.I. 77492.



PRESENTACIÓN:

Cajas con X cápsulas



INDICACIÓN:

Este medicamento está indicado en el tratamiento de apoyo de enfermedades osteoartrosicas (osteoartríticas).

~~MECANISMO DE ACCIÓN:~~

~~Piascledine estimula el mecanismo de recuperación del tejido conjuntivo, especialmente del cartílago, estimulando la producción de cartílago nuevo.~~

EFFECTOS ADVERSOS:

Son muy poco frecuentes. En algunos casos han sido descrito casos de malestar gástrico sin relevancia.

También se han presentado casos de regurgitación con sabor a los aceites, la cual disminuye o se elimina, administrando el producto junto con las comidas. En casos excepcionales pueden verse reacciones de hipersensibilidad y trastornos hepáticos.

INTERACCIONES E INCOMPATIBILIDADES:

No han sido descritas.

CONTRAINDICACIONES:

No se aconseja su uso en pediatría por no existir trabajos clínicos en este grupo erario.

No debe utilizarse durante el embarazo y la lactancia, salvo indicación médica expresa.

INTOXICACIÓN:

No han sido descrito casos de sobredosis. Si se sospecha un accidente por sobredosificación, se aconseja vigilancia y tratamiento sintomático.

POSOLÓGIA:

Como dosis promedio, una cápsula de Piascledine al día, tomado en medio de una de las comidas principales con abundante agua.

CONSEVAR EN LUGAR SECO A TEMPERATURA INFERIOR A 30°C

**PRODUCTO MEDICINAL,
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Venta ~~directa~~ **bajo receta médica** en establecimientos tipo A ~~y B~~

Elaborado en Laboratoires Expanscience, Francia.

Importado y Distribuido por

PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.

Av. Andrés Bello 1495, Santiago de Chile.

Bajo Licencia Laboratoires Expanscience, Francia.

FOLLETO DE INFORMACION
AL PACIENTE