



Piasclédine Insaponificables de Persea Gratissima y Glycine max.

CLASIFICACIÓN TERAPÉUTICA

Piasclédine está constituido por dos componentes: Persea gratissima y Glycine max, en la forma de insaponificables.

Estos compuestos insaponificables han probado ser efectivos en el manejo de episodios dolorosos de osteoartritis, de los cuales ellos parecen retardar su desarrollo.

Diversos estudios desarrollados *in-vitro* e *in-vivo* han confirmado los efectos beneficiosos de la asociación de insaponificables de **Piasclédine** sobre el cartílago.

Además, se han actualizado los primeros estudios de toxicidad subaguda y aguda mediante la realización de estudios recientes de toxicidad crónica, embriotoxicidad y teratogenicidad, como también por tests de mutagenicidad, con el objeto de confirmar la excelente tolerancia del producto.

COMPOSICIÓN:

Cada cápsula contiene: Extracto total de insaponificables de *Persea Gratissima* y *Glicine Max* 300 mg. correspondiente a: Insaponificables de Persea Gratissima 100 mg, Insaponificables de Glicine Max 200 mg Excipientes: Butilhidroxitolueno; Sílice coloidal anhidra (Aerosil) c.s.

INDICACIÓN:

Este medicamento está indicado en el tratamiento de apoyo en enfermedades osteoartrosicas (osteoartríticas)

MECANISMO DE ACCIÓN:

Piasclédine estimula el mecanismo de recuperación del tejido conjuntivo, especialmente del cartílago, estimulando la producción de cartílago nuevo.

EFFECTOS ADVERSOS:

Son muy poco frecuentes. En algunos casos han sido descrito casos de malestar gástrico sin relevancia.

También se han presentado casos leves de regurgitación, la cual disminuye o se elimina, administrando el producto junto con las comidas. En casos excepcionales pueden verse reacciones de hipersensibilidad a *algunos de los* componentes de la fórmula.

PRECAUCIONES:

Piasclédine no debe ser ingerido por personas alérgicas a uno de los componentes de la fórmula.

CONTRAINDICACIONES:

No se aconseja su uso en pediatría por no existir trabajos clínicos en este grupo etario. No debe utilizarse durante el embarazo y la lactancia, salvo indicación médica expresa.

INTERACCIONES E INCOMPATIBILIDADES:

No han sido descritas

SOBREDOSIS (INTOXICACIÓN):

No han sido descritos casos de sobredosis. Si se sospecha un accidente por sobredosificación, se aconseja vigilancia y tratamiento sintomático.

POSOLÓGIA:

Como dosis promedio, una cápsula de **Piasclédine** al día, tomado en medio de una de las comidas principales o de lo contrario con abundante agua.

PRESENTACIÓN: Cajas con 30 cápsulas.