

Altazinc Sulfato De Zinc 5 mg/ml Gotas 30 MI





Altazinc Sulfato De Zinc 5 mg/ml Gotas 30 ml

Altazinc Sulfato De Zinc 5 mg/ml Gotas 30 ml está indicado para el tratamiento de los estados carenciales de zinc por escaso aporte o mala absorción intestinal.

Beneficios

Profilaxis y tratamiento de los estados carenciales de zinc por escaso aporte o mala absorción intestinal y otras condiciones que interfieren con su utilización o que aumentan su pérdida corporal, previa determinación de los niveles plasmáticos de zinc. Estados que requieran una protección específica como: etapa de crecimiento, desarrollo esquelético, intervención quirúrgica, déficit nutricional, alimentación no balanceada y déficit de zinc. Coadyuvante en la terapia de hipogonadismo e hipotiroidismo.

Principales principios activos

- Zinc.

Modo de uso

Vía oral. Forma de administración: Si no hay irritación gástrica, el zinc debe ser administrado 1 hora antes o al menos 2 horas después de las comidas, debido a que muchos alimentos interfieren con su absorción. Dosis usual profilaxis: Altazinc® gotas: 0-6 meses: 2 mg/día (8 gotas); 7 meses-3 años: 3 mg/día (12 gotas); 4-11 años: 5 mg/día (20 gotas). Para una correcta dosificación de Altazinc® gotas, mantenga el frasco en posición vertical. Altazinc® comprimidos 10 y 15 mg: Niños 6-11 años: 5 mg/día (comprimido de 10 mg/día); Mayores de 12 años: 10-15 mg/día (1 comprimido/día). Para el tratamiento del déficit: La dosis es de acuerdo a la indicación y la severidad del déficit.

¿Cuándo tomar Altazinc?

Coadyuvante en la terapia de hipogonadismo e hipotiroidismo. Posología: Vía oral. Forma de administración: si no hay irritación gástrica, el zinc debe ser administrado 1 hora antes o al menos 2 horas después de las comidas, debido a que muchos alimentos interfieren con su absorción.

ALTAZINC®

Laboratorio: SAVAL

Drogas:

- Zinc

Acciones:

- Nutrición:Minerales

Acciones:

- **Gotas:** Cada ml equivalente a 20 gotas de solución oral contiene: Zinc (como sulfato heptahidratado) 5 mg. Excipientes c.s.p. **Comprimidos 10 mg:** Cada comprimido contiene: Zinc (como sulfato heptahidratado) 10 mg. Excipientes c.s.p. **Comprimidos 15 mg:** Cada comprimido contiene: Zinc (como sulfato heptahidratado) 15 mg. Excipientes c.s.p.



- Profilaxis y tratamiento de los estados carenciales de zinc por escaso aporte o mala absorción intestinal y otras condiciones que interfieren con su utilización o que aumentan su pérdida corporal, previa determinación de los niveles plasmáticos de zinc. Estados que requieran una protección específica como: etapa de crecimiento, desarrollo esquelético, intervención quirúrgica, déficit nutricional, alimentación no balanceada y déficit de zinc. Coadyuvante en la terapia de hipogonadismo e hipotiroidismo.
- Vía oral. **Forma de administración:** si no hay irritación gástrica, el zinc debe ser administrado 1 hora antes o al menos 2 horas después de las comidas, debido a que muchos alimentos interfieren con su absorción. **Dosis usual profilaxis:** **Altazinc®** gotas: *0-6 meses:* 2 mg/día (8 gotas); *7 meses-3 años:* 3 mg/día (12 gotas); *4-11 años:* 5 mg/día (20 gotas). Para una correcta dosificación de Altazinc® gotas, mantenga el frasco en posición vertical. **Altazinc®** comprimidos 10 y 15 mg: *Niños 6-11 años:* 5 mg/día (comprimido de 10 mg/día); *Mayores de 12 años:* 10-15 mg/día (1 comprimido/día). **Para el tratamiento del déficit:** La dosis es de acuerdo a la indicación y la severidad del déficit.
- **Gotas:** Envase conteniendo 30 ml solución oral para gotas: 5 mg/ml (20 gotas). **Comprimidos:** Envase conteniendo 40 comprimidos ranurados de 10 y 15 mg.