



KLINER SNL OFTÁLMICA 15 ml



Lágrimas Artificiales
Solución Oftálmica

Clasificación: Lubricante ocular.

COMPOSICIÓN:

Cada 100 mL de solución oftálmica contiene:

Hidroxipropilmetilcelulosa 0,300 g

Dextran 0,100 g

Excipientes: Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de benzalconio, Edetato disódico, Ácido clorhídrico o Hidróxido de sodio, agua purificada.



Descripción del producto:

1. ¿PARA QUÉ SE USA?

Este producto es una solución estéril para ser utilizada como lágrima artificial, es un agente lubricante en varios síndromes de irritación ocular (ojos secos), irritaciones menores de los ojos o para exposición al sol o viento, debido a que es una solución poco viscosa permite una mayor retención de la lubricación del ojo.

2. ADMINISTRACIÓN:

Oftálmica

Rango y frecuencia:

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante, la dosis usual recomendada es de una a dos gotas de solución con la frecuencia requerida para aliviar los síntomas de irritación ocular. En algunos pacientes se puede requerir doblar la dosis para obtener resultados óptimos.

Consejo de cómo administrarlo:

Debe aplicar el producto sobre la conjuntiva, sin poner en contacto la punta del envase con el ojo, debe dejar caer la gota sobre el ojo. El envase debe mantenerse cerrado de forma ajustada.

Debe lavar sus manos con jabón antes y después de usar este producto.

Uso prolongado:

Si la irritación persiste, debe discontinuar el uso y consultar a su médico.

3. PRECAUCIONES

Mayores de 60 años:

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de este producto, por lo que debe seguir las indicaciones de su médico durante el tratamiento con Kliner® solución oftálmica.

Manejo de vehículos:

Asegúrese del efecto que tiene sobre usted este producto, antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa, ya que este producto puede causar irritación ocular por hipersensibilidad.

Embarazo y Lactancia:

Se desconoce la seguridad de su uso en mujeres durante el embarazo y período de lactancia, por lo que se recomienda no utilizar.

Lactantes y Niños:

Los niños son más sensibles a los efectos adversos de este producto, el pediatra debe evaluar el tratamiento recomendable para su niño.

Precauciones especiales:

- No debe usarlo si la solución está turbia o si cambia de color.
- Es importante que no utilice una cantidad mayor que la que se ha indicado.
- Tape el frasco después de usar.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.



– En caso de ingestión accidental solicite asistencia profesional en el hospital más cercano o contáctese con un centro toxicológico inmediatamente.

4. USTED NO DEBE USAR ESTE PRODUCTO EN LOS SIGUIENTES CASOS:

Si ha presentado síntomas de alergias a Hidroxipropilmetilcelulosa y/o Dextrán u otras soluciones oftálmicas.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

5. INTERACCIONES:

Hasta el momento no se conocen interacciones.

6. EFECTOS ADVERSOS:

Existen efectos que se presentan rara vez, ocasionalmente puede producirse sensación leve y transitoria de quemazón y picor y muy raras veces, reacciones de irritación o hipersensibilidad.

7. SOBREDOSIS:

Hasta el momento no se han registrado casos de sobredosis.

8. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

- Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor, luz y humedad a temperaturas inferiores a 25°C.
- No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.
- No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico.
- No recomiende este producto a otra persona.