

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su médico

Eltoven Comprimidos recubiertos TOLTERODINA L-TARTRATO Vía Oral

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE DEPARTAMENTO CONTROL NACIONAL SUBDEPTO. REGISTRO	
UNIDAD PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	SIMILARES
20 JUN 2008	
Nº Ref.	1068/08
Nº Registro	+16879/08
Firma Profesional	[Firma]

FÓRMULAS:

Eltoven 1mg: Cada comprimido recubierto contiene:

Tolterodina L-tartrato 1 mg (equivalente a 0,68 mg de **Tolterodina**);

Excipientes: ~~Ácido silíceo~~ **Dióxido de silicio** coloidal; Almidón glicolato sódico; Óxido de hierro amarillo; Celulosa microcristalina; Fosfato dicálcico anhidro; Estearato de magnesio; Opadry blanco Y-1-18128-A (**hipromelosa, triacetina, dióxido de titanio**); ~~Poliethylenglicol 600~~ **macrogol 6000**, c.s.

Eltoven 2mg: Cada comprimido recubierto contiene:

Tolterodina L-tartrato 2 mg (equivalente a 1,37 mg de **Tolterodina**);

Excipientes: ~~Ácido silíceo~~ **Dióxido de silicio** coloidal; Almidón glicolato sódico; Colorante amarillo oca o laca aluminica; Celulosa microcristalina; Fosfato dicálcico anhidro; Estearato de magnesio; Opadry blanco Y-1-18128-A (**hipromelosa, triacetina, dióxido de titanio**); ~~Poliethylenglicol 600~~ **macrogol 6000**, c.s.

PRESENTACIONES

Eltoven 1mg: Envases conteniendo X comprimidos recubiertos.

Eltoven 2mg: Envases conteniendo X comprimidos recubiertos.

ACCIÓN FARMACOLÓGICA:

Eltoven (Tolterodina) es un antiespasmódico urinario con elevada afinidad por los receptores muscarínicos de las vías urinarias.

INDICACIONES:

Eltoven, está indicado en el tratamiento de la vejiga hiperactiva con aumento de la frecuencia urinaria y en los cuadros de incontinencia por urgencia urinaria.

ACCIONES COLATERALES:

La **Tolterodina** puede en raros casos ocasionar algunos efectos secundarios desagradables, entre los que se destacan sequedad de boca, dispepsia, constipación, flatulencia, cefaleas, sequedad ocular, somnolencia y parestesias.

Más raramente pueden aparecer visión borrosa y retención urinaria (en pacientes prostáticos).

CONTRAINDICACIONES:

La **Tolterodina** está contraindicada en pacientes con retención urinaria, glaucoma de ángulo estrecho no controlado o en aquellos casos en que exista conocida hipersensibilidad a la sustancia activa.

Debido a que se carece de estudios controlados, no se aconseja utilizar **Tolterodina** en mujeres embarazadas ni en aquellas que amamantan.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

La **Tolterodina** debe utilizarse con precaución en pacientes con enfermedades obstructivas de las vías urinarias, en los cuales existe el riesgo de provocar retención urinaria. También debe utilizarse con precaución en pacientes con glaucoma de ángulo estrecho incipiente.

En caso de insuficiencia hepática, la dosis de **Tolterodina** no debe exceder 1 mg dos veces por día.

INCOMPATIBILIDADES: No se han descrito hasta el momento

INTERACCIONES: Algunos medicamentos antimuscarínicos del tipo de los antidepresivos pueden potenciar el efecto de la **Tolterodina**.

POSOLOGÍA:

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular, no obstante la dosis promedio usual de **Eltoven** es de 2 mg dos veces al día.

En pacientes con insuficiencia hepática 1 mg dos veces al día.

SOBREDOSIS:

En caso de sobredosis accidental con **Tolterodina** se debe realizar lavado gástrico, utilizar carbón activado y tratar sintomáticamente al paciente para controlar los efectos anticolinérgicos (alucinaciones, excitación, convulsiones, taquicardia, dificultad respiratoria retención urinaria, midriasis, etc.).

CONSERVAR EN LUGAR SECO A TEMPERATURA INFERIOR A 30 °C

PRODUCTO MEDICINAL, MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Venta bajo receta médica en Establecimientos Tipo A

Fabricado por **ROEMMERS S.A.**

Cno. Maldonado 5634. Montevideo. Uruguay

para PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.

Avda. Andrés Bello 1495. Santiago.



PHARMA INVESTI

Página 3 de 3

FOLLETO DE INFORMACION
AL PACIENTE