

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE**METICEL OFTENOL SOLUCIÓN OFTÁLMICA**

Excelencia en oftálmicos

PROYECTO DE INSTRUCTIVO METICEL OFTENOL[®]
EMPAQUE LATINO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE
 AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS
 SUBDEPTO. REGISTRO Y AUTORIZACIONES SANITARIAS
 OFICINA MODIFICACIONES

09 FEB 2012

N° Ref.: MT 248322/11
 N° Registro: F-16775/08
 Firma Profesional: [Firma]

Logo Sophia

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE**Meticel Ofteno[®]**

Hipromelosa 0.5%
 Solución Oftálmica Estéril

Lea cuidadosamente este instructivo antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante a cerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda, pregunte a su médico o químico farmacéutico. Guarde este instructivo, puede necesitar leerlo nuevamente.

COMPOSICIÓN:

Cada mL (30 gotas) contiene:

Hipromelosa.....	5.0 mg (0.5%)
Vehículo csp	1.0 mL

Excipientes: ~~Cloruro de sodio, fosfato dibásico de sodio anhidro, fosfato monobásico de sodio monohidratado, cloruro de benzalconio como conservador (sol. al 50%), 0.22 mg/mL.~~
 Cada gota contiene aproximadamente 0.16 mg de Hipromelosa.

Según última fórmula aprobada en el registro sanitario**CLASIFICACIÓN:**

Lubricante ocular.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

~~METICEL OFTENOL[®] al 0.5% es un lubricante ocular (lágrima artificial) indicado para el alivio temporal del ardor, de la sensación de cuerpo extraño y de la sequedad ocular debidos a conjuntivitis, queratoconjuntivitis, blefarconjuntivitis, queratitis por exposición, queratitis neuroparalítica, blefaritis, irritaciones oculares leves por rayos solares, polvo, aire, aguas cloradas, agentes químicos débiles y exposición a luz intensa. Además, está indicado como coadyuvante en cualquier tratamiento tópico ocular para restablecer la calidad de la película lagrimal precorneal y prolongar el tiempo de contacto de las drogas empleadas en aplicación tópica.~~

~~Ventajas: su consistencia ligeramente viscosa lo hace permanecer por tiempo prolongado en contacto y lubricando la superficie ocular.~~

FOLLETO DE INFORMACIÓN
 AL PACIENTE

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE**METICEL OFTENOL SOLUCIÓN OFTÁLMICA**

Indicado para el alivio temporal causado por la irritación ocular, debido a la exposición al viento, sol u otros agentes irritantes y aliviar la irritación provocada por el síndrome de ojo seco.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a la hipromelosa y/o a cualquiera de los componentes de la fórmula.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Para las personas que utilizan lentes de contacto se recomienda quitárselos antes de la aplicación y después de 10 a 15 minutos colocarlos nuevamente.

Para evitar contaminación, no toque ni ponga en contacto la punta del dispensador con cualquier superficie.

RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA

Este producto no debe ser administrado durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la lactancia.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS

Irritación transitoria ocasional, adherencia del medicamento a las pestañas, con sensación de pestañas "pegajosas". Visión borrosa que puede durar algunos segundos.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO

METICEL OFTENOL® al 0.5% aplicado tópicamente no se conoce que produzca interacciones medicamentosas y se puede administrar concomitantemente con antibióticos, esteroides y antiglaucomatosos, aumenta el tiempo de contacto de los medicamentos con los tejidos oculares.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN


Dosis: El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento adecuado para su caso en particular. Sin embargo la dosis recomendada es: Aplicar 1 a 2 gotas ~~cada 6 a 8 horas~~, **3 a 4 veces al día ó según indicación médica.**

Descartar la solución remanente después de un mes de uso.

Vía de administración: Tópica Oftálmica.

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL

La sobredosificación tópica puede favorecer la aparición de los efectos secundarios y adversos locales, sin embargo, este producto no se absorbe sistémicamente por lo que no ocasiona problemas de intoxicación. Sus efectos secundarios son menores y locales. En caso de ingesta accidental, administre líquidos orales para diluirlo y consulte a su médico.



FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE**METICEL OFTENOL SOLUCIÓN OFTÁLMICA****PRESENTACIÓN**

Caja con frasco ~~un gotero~~ **gotario** con ~~teniendo 10 mL y 15~~ **XX** mL

RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO

Consérvese el frasco bien tapado a temperatura ambiente a no más de 30 °C.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en su envase. No repita el tratamiento sin consultar antes a su médico. No recomiende este medicamento a otra persona. No exceda la dosis recomendada.

Mantenga el producto lejos del calor excesivo y la humedad.

No se deje al alcance de los niños.

NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO

LABORATORIOS SOPHIA S.A. DE C.V.

Av. Paseo del Norte No. 5255

Col. Guadalajara Technology Park, C.P. 45010

Zapopan Jalisco, México

www.sophia.com.mx

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

LABORATORIO VOLTA S.A. Camino a Melipilla 7073, Cerrillos, Santiago, Chile, Bajo licencia de **Laboratorios Sophia S.A. de C.V.**

CONDICIÓN DE VENTA / REGISTRO SANITARIO:

Venta Libre: Siga correctamente el modo de usar y no desapareciendo los síntomas consulte a su médico. Chile: I.S.P. No. F-16.775/08 Venta directa en establecimientos tipo A y B; ~~Honduras: M 11931; Uruguay: Reg. M.S.P.: 42100 Venta libre en condiciones reglamentarias.~~

Venta bajo receta médica: Producto de uso delicado, adminístrese por prescripción y bajo vigilancia médica. ~~Bolivia: II 39198/2009; Costa Rica: 1007 QJ 2757; Ecuador: 20.144 1 01 01; El Salvador: 13,483; Guatemala: PF 1003; Nicaragua: 0108711195; Panamá: 25143; Perú: E 18793; Rep. Dominicana: 98 0745.~~

