

Aplica a especificación: EGM: G-INS-001-000-VV

Vuelta

Excelencia en oftálmicos




Sophipren
Acetato de 1%
Suplemento Oftálmico

FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE

Experiencia en oftalmicos


**Lea cuidadosamente este
instrucciones antes de usar
administración. Contiene información
importante acerca de su tratamiento. Si
tiene cualquier duda, pregunte a su médico
químico farmacéutico. Guarde este**

OFTEO es el tipo de esteroide que penetra
mejor al ojo. Su concentración al 1% le
permite una administración así que
controla rápidamente la inflamación
del ojo ya sea por cirugías complicadas,
traumatismos o cuadros agudos de uveítis.
Puede mejorar riesgo de producir glaucoma

Sophipren
acetato
Prednisolone 1%
Sospensione Oftalmica



Excelencia en oftálmicos

[illegible]

COMPOSICIÓN:

Aceite de *Pedicularis*..... 10 mg (1%)
 Vehículo csp. 1,0 mL
 Expientes: Cloruro de sodio, citrato de sodio
 edihidratado, ácido bórico, bisulfito de sodio,
 edulcorante, sodio dihidratado, cloruro de
 benzalconio, hipromelosa, polisorbato 80.
 Agua purificada c.s.p.

Hipersensibilidad al acetato de prednisona y/o a cualquiera de los componentes de la fórmula. Queratitis epitelial por Herpes simple (queratitis dendrítica). Tuberculosis ocular. Afecciones micóticas del globo ocular. Infecciones oculares purulentas agudas. Queratoconjuntivitis virales. Erosión corneal por cuerpo extraño. Quemadura corneal por láser. Después de 10 días de evolución, si el

Antinfiammatorio.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

que regulan las inflamaciones por infecciones bacterianas, fúngicas o parasitarias, así como por traumatismos, quemaduras, radiación y bulimia, la cornina y el segmento anterior del ojo ocular.

SOPHREN OPHENO está indicado en las condiciones inflamatorias y alérgicas del ojo OPHENO es especialmente útil en todo tipo de inflamaciones oculares y inflamación crónica del ojo, en el postoperatorio de cataratas, de estrabismo, de glaucoma, de cornea, de escleritis, de uveítis, de conjuntivitis, de origen alérgico. Por su acción antiinflamatoria, SOPHREN OPHENO mejora la penetración ocular es efectivo en diferentes cuadros de uveítis, como: fúls, indolécitas, ciclotis, coroiditis y coriorretinitis. Además, SOPHREN OPHENO mejora los padecimientos infecciosos de la superficie del ojo, como: conjuntivitis, queratitis y blefaritis, así como la adenitis de la glándula de Meibomio.

Su administración en forma conjunta con la terapia antibiótica adecuada. Venaject: SOPHREN

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

[illegible]

Para evitar contaminación, no toque ni ponga en contacto la punta del dispensador con cualquier superficie.

RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA:

este producto no debe ser administrado durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la lactancia.

REACCIONES ADVERSAS:	SECUNDARIAS	Y
-------------------------	-------------	---

predilección son: aumento de la presión intraocular con posible aparición de glaucoma, formación de catarata subcapsular posterior, infecciones oculares secundarias por virus o por hongos liberados de los tejidos oculares y retraso en la cicatrización de la herida.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO:

antibióticos, pero esto puede evitarse aumentando la dosis de los antibióticos. Los

absorción de las drogas tóxicas y favorecer la aparición de los efectos adversos.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN:
Dosis: El médico debe indicar la posología y

El tiempo de tratamiento adecuado para su uso en particular. Sin embargo la dosis recomendada es: Aplicar 1 a 2 gotas de SOSPAREN OTEÑO en fondo de saco conjuntival leve y en las condiciones de inflamación leve. En los cuadros de infección de la superficie del globo ocular y sus anexos, generalmente no se recomienda la aplicación de estendoides por más de 1 a 2 semanas.

Aplicar bien antes de usarse.

de administración: Tópica Ocular.

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA
SOBREDOSIIFICACIÓN O INGESTA
ACCIDENTAL:

En caso de sobreexposición tóxica, pueden aparecer los efectos secundarios y adversos

medicamento. En caso de ingesta accidental administrar líquidos orales para diluirlo.

Caja con un frasco gotario conteniendo 5 mL de suspensión oftálmica.

RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO:

temperatura ambiente a no más de 30 °C.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN:
No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en su envase. No reemplazar el tratamiento sin consultar antes a su médico. No recomiendo este medicamento a otra persona. No exceda la dosis prescrita. Mantenga el producto lejos del calor excesivo y la humedad.

Venta bajo receta médica.

LABORATORIO:
LABORATORIOS SOPHIA S.A. DE C.V.

Col. Guadalupe Technology Park,
C. P. 45010.

www.sophia.com.mx

Importado por GLOBAL MERCURY CHILE,
S.A. Antiguos Patstone No. 185, Oficina 505,
Santiago, Región Metropolitana, Santiago,
Chile.
Distribuido por NOVOFARMA SERVICE, S.A.,
v. Victor Uribe 2280, Quilicura, Santiago,
Chile.
Condicionado por LABORATORIO
NOVOFARMA, Av. Victor Uribe 2300,
Quilicura, Chile.
Mayor información en www.ispach.cl

Chile: Reg. I.S.P. N° F-16082. Venta bajo receta médica retenida en establecimientos

100%