

Fabricado a granel por AstraZeneca A.B., SE-151 85 Södertälje, Suecia. Envasado como producto terminado y procedente de AstraZeneca S.A. de C.V. Lomas Verdes, México. Super Av. 3000 N° 67, Fracc. Lomas Verdes, C.P. 04530 Naucalpan de Juárez, México. Bajo licencia de AstraZeneca UK Ltda, Londres, Inglaterra. Importado por: AstraZeneca S.A., Isidora Goyenechea 3477, Piso 2, Las Condes, Santiago-Chile. Distribuido por: Drogueria NovoFarma Service S.A., Av. Victor Uribe 2280, Quilicura, Santiago-Chile.

© AstraZeneca 2013

Nexium es una marca del grupo AstraZeneca.

Nexium is a trade mark of the AstraZeneca Group of companies.



Nexium™ 10_{mg}

ESOMEPRAZOL

Gránulos con recubrimiento entérico para suspensión oral.

Cada sobre contiene 10 mg de Esomeprazol en forma de esomeprazol trihidrato.
Esomeprazol reduce la secreción de ácido gástrico. El ácido gástrico es necesario para la digestión de los alimentos. La reducción de la secreción de ácido gástrico puede ayudar a aliviar los síntomas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), como el ardor de estómago y el dolor de pecho. También puede ayudar a prevenir la erosión del esófago y la formación de úlceras gástricas y duodenales. El esomeprazol también puede ayudar a prevenir la infección por *Helicobacter pylori*.

Se debe tomar 10 mg una vez al día con o sin alimentos. Si se toma con alimentos, se debe tomar antes de la comida principal. Si se toma sin alimentos, se debe tomar al menos 30 minutos antes de la comida principal. No se debe tomar más de 10 mg al día. Si se toma con alimentos, se debe tomar antes de la comida principal. Si se toma sin alimentos, se debe tomar al menos 30 minutos antes de la comida principal. No se debe tomar más de 10 mg al día.





Nexium™ 10 mg

ESOMEPRAZOL

Gránulos con recubrimiento entérico
para suspensión oral.

Cada sobre contiene:

10 mg de Esomeprazol en forma de esomeprazol magnesio hidratado

Excipientes: celulosa de azúcar, hipromelosa 5 mPa.s, colatoato K1, lactosa, talco, estearato de magnesio, copolímero del ácido metacrílico tipo C, óxido de hierro, monohidrato de glicerilo 40-50, glucosa anhidra, goma xantana, croscarmel·lulo, ácido cítrico anhidro, óxido de hierro amarillo c.i.

Para preparar una dosis de 10 mg, vacíe el contenido de un sobre de 10 mg en un vaso con 15 mL de agua no gaseosa. Para preparar una dosis de 20 mg, vacíe el contenido de dos sobres de 10 mg en un vaso con 30 mL de agua no gaseosa. Agitar y esperar unos cuantos minutos hasta que se espese la suspensión. Agitar nuevamente y beber la suspensión en un plazo máximo de 30 minutos. Si queda un poco de producto en el fondo del vaso, añada más agua, agitar y beber inmediatamente el resto.

28 sobres

AstraZeneca 

Indicaciones:
Tratamiento de la
acididad gástrica
excesiva y de la
reflujo gástrico
crónico.